


Le Osteologie



Osteologie nous paroitra bien sèche peu agréable, inutile
à la comparaison des autres parties de l'anatomie, mais si nous la
considérons attentivement, nous verrons quelle a des charmes, agréments
et utilités, on y trouvera de beaux contenus, et repaître un esprit
curieux et amateur des belles choses, et on connoitra enfin qu'il y a rien
en toute l'anatomie qui mérite mieux nos réflexions que la mécanique des os
du Corps des animaux, et même de l'homme, d'abord deux raisons principales
qui nous y conviennent. La 1^{re} est l'union et le plaisir de pouvoir adorer
quelque chose aux de couverts de nos prédecesseurs la 2^e est l'utilité
que nous en retirons, en effet s'il y a quelque chose de certain dans l'anatomie

n° 4.

C'est le squelette, les parties ny sont point confuses, comme dans les autres
parties de l'anatomie, mais comme elle a beaucoup des beautés et
utilités, je crois que iedant d'abord commencer à vous parler des
beautés en lesquelles sont en plus grand nombre, car qui a il de plus
charmant que de connoître l'admirable mécanique des os de la
tête de piéces jointes ensemble par un assemblage merveilleux
voir un ossement qui de fend et soutient le cerveau et le
siège de l'organe des sens les plus considérables, qui a il de plus
que d'admirer cette belle structure du bras, le composé de plusieurs
jointes, et unies avec un tel artifice qu'elles ne semblent faire qu'un
seul, comme l'expérience de ceux qui portent quelque fardeau
doit le démontrer, qui a il de plus beau que la composition de la main
de l'homme, par le moyen de laquelle il se distingue des autres animaux
et fait de si belles actions, ouvrages, et exploits, qui a il de plus curieux
que de bien connoître toutes les piéces qui composent le pied par lequel
l'homme est si adroit et vigilant à la danse et léger à la course? qui
a il de plus agréable que d'examiner la merveilleuse et surprenante
fabrique de la voûte de la poitrine qui en forme le principe de la vie,
et qui quoique osseuse pour défendre les parties les plus nobles de l'homme
quoique osseuse (dit-on) ne laisse pas de se remuer et de servir aux mouvements
de la poitrine, et se hausse, et se baisse, se dilate, et se resserre pour la
respiration, action des plus importantes et des plus nécessaires à l'homme?
y a il rien de plus charmant que de voir cette rangée des os comme
le piéce, se pouvoir mouvoir en tous sens et toutes ces différentes piéces
qui composent cette colonne, qui comme un canal osseux conserve
soutient et defend la moelle spinale, cette colonne qui est le principal
soutien et appui de l'existence par le moyen de laquelle l'homme
tient droit, enfin y a il quelque chose au monde de plus beau
que cette admirable mécanique dont la nature se sert pour
joindre et unir toutes les différentes piéces du squelette que tous
les arts iusques à présent nous n'en imitons que très grossièrement




ARC 10
d. 1

dans leurs ouvrages. mais si l'osteologie est si belle, elle n'est pas moins
utile, en effet au vice de grands ouvrages de cette science et on éprouve
assez dans la plus part des opérations de chirurgie combien elle est nécessaire,
et pour le faire toucher au doigt. Je me contenteray de prendre icy pour
exemple le seul trepan, non ce pas l'osteologie qui nous apprend à discerner
les fractures des sutures, et à ne point prendre une suture pour une
fracture comme l'hyppocrate avoient luy estre avinée ne nous enseigne
néanmoins les endroits où il faut appliquer le trepan? ne nous apprend elle
pas à ne le point faire sur les courbes à cause des sinus frontaux
ne nous apprend elle pas de ne le point faire sur les sutures à cause
des vaisseaux et des fibres qui vont du péricrâne à la dure-mère, au
péricrâne par l'insertion des sutures, et ainsi nous enseigne elle
pas quand on le fait sur les péricrânes particulièrement de prendre
garde de ne point enfoncer la couronne du trepan jusqu'à ce qu'on ayt
coupé tous à fait l'épaisseur du crâne, car comme la table intérieure
plusieurs sillons et inégalités on pourroit offenser la dure-mère
suivant quelques uns des vaisseaux qui sont situés dans les sillons,
ou l'on coupe toute l'épaisseur du crâne à l'endroit du sillon sans
s'en apercevoir l'on coupe à l'endroit des éminences qui bordent les
sillons enfin c'est une science dont on ne sauroit se passer sans
la chirurgie ou la médecine; car qui doute que sans elle c'est impossible
de remédier aux fractures et lésion des os si fréquents aux hommes
en qui doute que sans elle il est impossible de savoir le reste
de l'anatomie et que sans l'anatomie on ne peut avoir la médecine
si l'osteologie a les beautés et les utilités, qui comme aucuns des charmes
en d'autres nous poussent et incitent à l'entreprendre, elle ne manque
pas un sty de dix talens; mais à y voir roses sans épine, car en effet
il n'est pas facile de comprendre comment les os se engendrent, se
nourrissent et comment ils croissent.

Il estoit facile aux anciens de dire que les os sont engendrés par le
moyen de la faculté formatrice qui étoit la partie la plus riche
et la plus froide de la semence pour cela; mais en vérité cette
faculté formatrice n'est elle pas plus obscure que la chose même, et
ne se peut avoir recours pour expliquer une chose qui est difficile
à une qui est encore plus obscure nous en savons moins; mais nous
les abandonnons volontiers, voyons si les veaux les expliquent plus
intelligiblement.

plusieurs voyent avec beaucoup de vray semblance que les os ne sont
pas des tendons endurcis, ce qui se prouve par tout les raisonnemens
suivans, les tendons sont nourris presque de la même manière que les os
et presque de la même substance les uns sont durs et d'autres






2
et deviennent assez souvent offense comme aux vieillards, et aux autres
et lorsqu'on arrive à la base du coeur des corps non que le tendon des fibres
des os qui les ossifient, mais dans leur commencement sous motif de
dureté consistence à peu près semblable à celle des tendons les tendons
étant une fois. Après ils ont un suc sous a fait semblable à celui qui
des os lasses à l'exception qu'il est moins salin, d'autant qu'ils ne sont
point si durs et que le sang se congèle, se partit en forme des fibres et d'autant
assez semblables aux calus des os, il y a plusieurs muscles qui nous
peuvent donner tendons que le corps de l'homme, on remarque même
que quelques membranes qui ont beau coup de rapport aux tendons deviennent
ossues et bien souvent les artères aux vieillards, ce qui provient apparemment
de ce que leurs substances est assez semblables à celles des tendons et
nourrie d'un suc salin et tartareux de même que les tendons et les os
les sensitives du sang. Les artères à leur paroi font des croûtes qui leur servent
la mort du ressort, et ainsi ne sont plus en mouvement, le suc salin et
tartareux se fige et prend la nature de l'os, ce qui gênerait et trouble la
circulation du sang qui se fait alors sur les parties et ainsi font
plusieurs tumeurs et fluxions comme on voit dans les vieillards
les artères offenses pour le plus souvent.

Mais nous savons bien que les os, aussi bien que toutes les
parties ont pris leur commencement dans l'œuf, car quoiqu'il
matière dans l'homme qui est formée dans la matrice soit d'un
assez fluide à peu près de la même nature qu'un blanc d'œuf, on
peut pourtant croire qu'on peut le voir quelle couleur plusieurs
parties de différente nature et de différente acidité dans l'acide
sulfurés, qui se trouvent continuellement de l'augmentation de
nouvelles parties qui y arrivent sans cesse et qui viennent du sang de la
mère se changeant en petites en fibres, en muscles et en os par l'action
des esprits qui se mêlent parmy expliquons comment ils se nourrissent
croissent et se développent.

Les anciens ont cru que les os se nourrissent de la moelle du suc
moelleux mais cela ne parait pas très véritable car il y a plusieurs os
qui sont froids durs et solides et qui nous ne moelle ny suc ^{moelleux} comme
les dents et les osselets des oreilles et cependant ils peuvent se nourrir
se développent.

Entre les ossements les parotides du suc nerveux lui ont attribué
une prérogative, mais cela sans aucun fondement et apparence
car on voit que le suc est imaginaire et fantastique nous voyons dans
la paralysie dans la rachitide ou rabée dorsale maladie de la moelle
du dos, que les os se nourrissent et les chairs se dessèchent, ce qui prouve



que les chairs ne peuvent point se nourrir sans esprit animal & qu'ils
par les nerfs, mais que les os au contraire peuvent se nourrir sans esprits,
ditons donc puisque les os ne se nourrissent point de la moelle ny d'une
nerveuse, qu'ils ont des organes propres pour leur porter & donner la nourriture
en qu'ils sont nourris du sang que plusieurs artères qui entrent dans leurs
substance par des trous visibles leur portent; mais qu'il en soit autrement
d'une autre manière que les chairs, c'est à dire sans avoir besoin d'esprit
esprits, quoique leurs artères & veines soient remplies de sang, mais
se nourrissent non de tout le sang, mais de la partie la plus subtile,
nourrissante & balsamique, & enfin que cela soit plus intelligible,
ditons quelque chose en général de la nature & composition des os, & après
nous examinerons leur nourriture avec plus d'attention.

Des os les uns sont sensiblement poreux & spongieux comme ceux du
crâne, & les apophyses, & renferment dans leur cellule une substance
douce & molleuse; d'autres sont forts durs & solides comme les os
des osselets des oreilles, enfin d'autres sont faits des fibres tendues le
de l'os, & lui font une cavité fort considérable qui renferme une
substance douce & molle que nous nommons moelle, comme sont les os du
la cuisse quoy que pourrions nous les os ne semblent pas estre
de même nature & que la diversité de leur substance semble provenir
de leur origine, néanmoins on peut dire qu'ils ont tous d'une même
origine, & qu'ils viennent d'un même principe & que toute la différence
est du plus ou moins.

Il est à noter que si l'on fait des os quand on les expose au feu de montre & qu'on les
examine & les principes qui le composent. ils rendent d'abord quelque
peu de flegme & de viscid. verdue & de couleur.

Quand les os sont formés ils croissent & se nourrissent par le moyen du sang
comme les autres parties, & cela se prouve par la quantité d'artères & des
veines qu'on remarque si distinctement dans les os des nouveau nés
or cette nourriture est convenable à leur nature & à leur substance
c'est à dire que de tous les particules subtiles, & terreuses qui se rencontrent dans le
sang mais il n'est pas aisé de déterminer comment elles se séparent du reste
de la masse du sang pour la nourriture des os, & cela se fait par un
artifice si singulier de la nature & durs de recevoir & cachés qu'il est bien difficile
de voir clair, il est pourrions nous sembler que le sang arrivant aux os
laisse échapper quelques particules subtiles qui venant à se rencontrer d'autres
qui sont de la même nature se joignent & s'unissent avec elles & que ces
esprits dont nous avons parlé les dirigent & les disposent jusqu'à ce qu'ils
ayent pris la forme des os.

La chimie nous apprend que les sels se séparent & se combinent aisément
d'une les autres, & qu'ils se combinent même quelques fois dans l'eau ordinaire.


auili estroit dessous augmentant et qui se forment de corps durs adins angles,
pourquoy est la que les parties salines ne se forment pas et ainsi augmentent
les os
après avoir expliqué la generation, nourriture et accroissement des os
pour en avoir une idée plus parfaite il faut examiner la generation et
nourriture des cornes ongles et dents.

La formation des cornes est bien differente de celle des os, ces os sont tous
formés dans le fœtus, et les cornes ne paraissent aux petits animaux
que longuement après leur naissance. 2^e Les os n'ont qu'un tissu de fibres ou
petits canaux pressés les uns auprès des autres, ce qui en fait la solidité,
les cornes ne sont autre chose qu'une amas de lames dures, enfin les os
augmentent par la grosseur qu'exigent leurs fibres, les cornes au contraire
ne s'accroissent que par la multiplicité de leurs couches ou lames
pour bien entendre la generation des cornes et des ongles il faut vous donner
une idée grossiere de la structure de la peau, parce que nous en parlerons
plus amplement ailleurs, la peau est plusieurs membranes aux quels sont
plusieurs fibres nerveuses, les mammelons sont enroulés dans des
membranes qui les enveloppent de ces mammelons ainsi enroulés par
une queue qui vont à la cavité, cela est ainsi supposé voyez
s'engendrent les cornes.

La table extérieure du crâne s'élevant fait une petite apophyse
pressant la peau etlige les mammelons de la peau et presser la
enroule toute cette apophyse, la peau étant ainsi déterminée une
saline et pressant commune. au tour lequel sont les mammelons, les
endurcit par conséquent et étant endurcis ils deviennent transparents, et sont
ce qu'on appelle cornes voyons comment après cela elles se nourrissent et
augmentent par le moyen du sang de même que les os.

pour s'assurer que les cornes sont nourries et augmentées par le sang
il n'y a qu'à regarder la corne d'un animal fraîchement tué la
cette corne est toute Anglaise, voyons d'un vœux le sang.

le sang qui nourrit les cornes vient des vaisseaux qui parcourent la
superficie d'un morceau de chair qui se rencontre une bœuf dans la
cavité de la corne, entre la peau et la corne, le morceau se retourne
d'une membrane fine et délicate qu'on peut même qu'on doit prendre
pour la peau cette chair a la figure d'une pyramide, mais elle ne se
rencontre point au corps, elle est fort dure dans les bœufs, encore plus
dans les chèvres et moutons, mais celle qui se rencontre dans la denture de
le la plant que nous devons prendre pour une espèce de corne qu'on appelle
se divise en lames, elle est grande et s'étend jusqu'à la racine de la denture
ce qui fait apparemment quelle devient si grande.



les artères de la nouvelle de chair poussent continuellement une
partie du sang qu'elles contiennent, le sang en adipe la partie la plus
saline se respend sur toute la superficie extérieure de l'attachement pour
cette corvauation lie communément au pied les mammeles de la peau &
ce fait la première couche, les artères poussent de nouveau du sang qui
s'arrête et s'indurcissant sur la chair fait la 2^e couche, or ainsi successivement
croît la corne toutes les couches s'attachant les unes dans les autres à peu
près comme les cornes d'épicer dont les plus petits sont ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE les plus grands.

Les bords des cornes nous point le mouvement de chair et de sang qui
attache que la queue qui couvre la tête, deviennent qui ne tiennent pas
si fortement que les autres cornes la peau embrasse étroitement le pied
de cette corne, et s'étend à peu près à 4 ou 5 pouces de hauteur, en
pourquoi les cornes des jeunes corps qui nous point juste cette hauteur
sont couverts de la peau mais avec l'âge les cornes poussent toujours,
déchirant la peau pour se faire passage, et cette peau ne pouvant
s'attacher et s'unit fortement à la base et fournit des apertures
par où le sang est insensiblement parvenue le sang qui doit faire
la chair, ce qui est envoyé par des conduits intérieurs de la corne
de gelée qui s'endurcit peu à peu devient que si on coupe le
bord d'un corn, il sort du sang qui se coagule instantanément, ce qui
ne s'y trouve, on voit avec une loupe plusieurs filons creux
qui peuvent être autre chose que les canaux osseux qui portent
la matière de la nourriture mais comme les artères ne peuvent pas
porter le sang avec une assez grande force pour le faire aller aux
extrémités et éloignées du centre de la corne où sont ces tuyaux,
elles se dessèchent faute de nourriture, ce qui occasionne les cornes à se
décharger de ce fardeau inutile en se frottant contre les arbres; mais
jamais avant qu'elles deviennent comme le rugueux de diamant, et cela
arrive le printemps sur l'hyver le froid ayant resserré les pores pour en
tenir la nourriture il sentait qu'elles sont mortes, mais comme elles
ont encore quelques racines elles ne peuvent pas tomber, mais le printemps
la fermentation se renouvelant fournit de la matière au pied de la corne
qui se fait enfin pousser couche sur couche communément au pied de la corne
fait tomber les branches mortes de même que les fruits mûrs tombent
de leurs queues, manque de nourriture, et les fleurs sont poussées par
les fruits ou graines des plantes, remarquez il y en a tant que les bords
des cornes ont leur superficie extérieure fort raboteuse, et toute gravée
et pleine des sillons qui ont été formés de même que ceux qui sont ad-
hérents intérieurs du crâne par le battement des artères de la queue qui couvrait
la corne pendant qu'il étoit en l'air jeune et tendre, et qu'en se frottant la
pierre de la corne contre la corne des arbres ils la polissent.

Après avoir expliqué la génération et nourriture des cornes nous

passons a celles des ongles, et principalement par celles du pied des pieds des chevaux,
et pour cela remarquons que toutes ces petites feuilles sont comme autant de couches
de mamelons qui assemblés font la corne du pied qu'on nomme le sabot,

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N

lequel intérieurement on voit plusieurs enfoncements ou enfoncements en boîtes
sous les éminences qui sont a la peau qui entourent le pied et qui ne sont autre
que les mamelons de la peau. De la vous pouvez tirer deux conséquences
que quand l'ignorerait un cheval ami le bon usage auant il en étoit
le cheval a cause qu'il pique les mamelons, la se est que quand le sabot d'un
cheval est tombé, il faut prendre garde de ne point arracher les feuilles
qui restent et de ne point trop former le pied du cheval, car on ne verrait le
sabot qui se rendrait mort. Nous avons maintenant a examiner les ongles
des pieds et des mains qui se font précisément de la même manière que
nous venons de dire, car les petits mamelons de la peau, venant a se joir
par le suc salin font l'ongle en effet il ne s'enquendrent point par la
racine. Seulement comme on a creu, car si cela étoit, il faudrait qu'une
partie de l'ongle quitte les attaches, ce qui l'arriverait, au lieu
que dans notre système il n'est point besoin de cette fausse supposition
puisque que l'ongle nait de toutes les parties qu'il touche a la peau et
le pousse bien en l'extension des. A dire un mot de la
que les ongles commencent a naître par l'extrémité et qu'il se
duraissage est que la peau du dessous des pieds des paillans devient la
dure et a peu près semblable a l'ongle.



Il faut remarquer que les coquillages et toutes les escuilles des dents
qu'on nomme fruscales se forment précisément de la même manière que
les cornes et les ongles.

on nous demande donc que les ongles sont plus durs a leur extrémité
qu'ailleurs. cela est fort facile a comprendre dans notre système, car
comme il nait sous la peau qu'il pousse et que sous les mamelons
nous le venons et se joindre a l'extrémité, il ne faut pas être surpris,
si elle y est plus dure et plus épaisse.

on nous demande encore pourquoi une tache blanche par le suc salin
a l'extrémité il n'est pas bien difficile de répondre car quand par malheur
il arrive une tache dans une couche du mamelon vers la racine, cette
tache étant poussée vers l'extrémité, la tache le doit être pareillement,
la même chose arriverait si la tache se venait vers ailleurs qu'a la racine.

Enfin on nous demande l'explication d'un phénomène qu'on parait
d'importance qui est ce que rapporte un auteur digne de foi qui en qu'il
avoir vu des personnes qui ont eu l'ongle arraché et il en venait
plus d'autre a la place mais bien a la racine ou a l'extrémité.
a cela se dit que le suc salin ayant été empêché de couler au l'extrémité commune,

après que la dent est tout à fait endurcie, il ne reste plus que les vaisseaux qui ont un peu de la membrane, qui les fournissent entrans un peu avant dans la cavité de la dent pour la nourriture.

Nous venons de remarquer avec quel avantage la nature dispose le noyau de la dent en commençant couche sur couche la membrane qui l'environne lui fournit la matière dont elle est formée, quand enfin pour le travail de matière elle est poussée de hors, elle déchire et casse les fibres de la membrane, dont une partie reste avec les vaisseaux, entre autres dans la substance de la dent pour la nourriture, mais elle ne casse plus seulement les fibres de la membrane mais aussi la gencive, et communique à paroitre en cet ordre.

La nature produit d'abord 4 incisives et 4 canines, et 4 molaires en chaque mâchoire, rarement d'un autre, en cet ordre qu'après qu'une de la mâchoire supérieure est sortie, s'en sort une de l'inférieure, et successivement les autres.


Examinons un peu après que les accidens qui l'accompagnent pour l'ordinaire la sortie des dents, les accidens sont en fort grand nombre quand les dents commencent à percer on voit des convulsions, épilepsie, vomissement, cours du ventre, fièvre et quelque fois la mort pour quelques uns.

Je suppose avec moi que le périoste et la membrane interne de la bouche comprennent la gencive avec plusieurs vaisseaux sanguins, fournissent la rougeur, et est ce qui ne seroit pas beaucoup difficile de prouver, mais comme le périoste n'est qu'un développement des tendons des muscles voisins, il seroit que la dent en cassant les fibres par plusieurs secousses elle doit faire tomber tous les muscles du visage en convulsion et même en épilepsie selon que l'enfant aura eu du côté de la mère, selon la faiblesse de son tempérament, car la convulsion se continuant au genre nerveux selon qu'il sera susceptible de les impressions, il les recevra, et les esprits animaux estant ainsi déterminés à couler dans les muscles de la face doivent comprimer le réservoir de la salive, fournissent qu'ils continuellement, et par les fréquentes expressions en faire exhaler la partie la plus volatile de qui reste doit être plus acide et les fumes acides de ce lymphé acide, elle lui doit causer une toux sèche, irritant les parties du larynx, et descendant dans l'estomac qu'elle casse la membrane nerveuse, et ainsi cause la nausée, mais si elle est plus forte elle doit en exprimant la liqueur pancréatique et bilieuse obliger les intestins à se mouvoir et faire le cours du ventre.

Enfin soit le genre nerveux estant en convulsion, les esprits animaux coulent au cœur avec grande impetuosité, et en abondance le font sauter plus fort que de coutume, ce qui est cause que les particules du sang sont



2
surplus arbrés et la salive aigre se mêlant avec luy
fermenter et ainsi causer la fièvre qui emportera les dents
sans en robuer pour y revenir.



Pour remédier à tous ces troubles et pour tenter de rendre la gencive
molle souple et flexible, le quinquart fait avec la racine d'aloeu qu'on fait
trempier dans eau de mauve ou avec du miel pour les contractions des muscles
de la face, on se sert de moelle de veau dans on les pose, tous ces remèdes ne
faisant rien on ouvre la gencive, on se sert pour les maladies du dedans
pour la lymphé aigre de gelée de corne de cerf dissoute dans le lait de la
mere, ou dans un bouillon ce pour ramolir d'ailleurs les gencives de graine
ou de sang de viciux loy.

Après avoir examiné la generation, nourriture, production et
accidans qui a accompagné leur sortie et leur retour on a de voir
communs elles se voyent dans le qui a fort tourmenté les anciens et
surtout en l'on quelques nouveaux.

estre ceux qui ont expliqué la regeneration des dents les uns ont dit
qu'estant arrachés, l'humour glaireux qui couloit dans la cavité de la gencive
pour la nourriture se pressoit et forme la 2^e.

D'autres ont creu comme Vesale et Colombe qu'elle se voyent dans la gencive
quand la racine avoit une fort estée emportée, les autres se disent qu'ils
conseillent de ne point arracher les dents, mais de les rompre plusieurs.

Les deux opinions nous ont une vraie semblance, solidité ny fondement
puisque la 1^{re} ne sçait expliquer pourquoi la deuxième dent estant
arrachée a un jeune homme, il ne revient point de dents, et la deuxième est
tous a fait extravagance et repugne a la génération de sa nature.

En fin plusieurs ont dit que l'os de la mâchoire se remoult, mais les
meilleurs ne peuvent pas bien le sçavoir de la nature qui entretient les
opérations en univoque la plante, et dans la semence et dans la germination,
les bois des corps qui semblent revenir tous les ans et sont dans le bois comme
nous avons dit, et le système d'admettre fort bien dans la chéville, ou les
quartiers du papillon sont toutes entières en fin dans l'homme aussi bien
que dans les autres animaux, a qui les dents reviennent, il y a deux moules
comme se luy remarque plusieurs fois, et même violon l'os de la mâchoire
l'os de la mâchoire dans l'homme. lib. 2^o en chiv. anat. puy. 67 et cette
deuxième dent est séparée de la première par une membrane de même
nature que celle qui entoure la 1^{re} et qui luy fournit la nourriture
comme a la première.

Cette 2^e dent dans le crocodile qui na que de dents canines est
située d'une telle manière que son extrémité aigue répond à la cavité
de la bête de la 1^{re} dans l'homme, les deux moules ne sont pas de même
ils sont un peu séparés, ce qui fait que la 1^{re} dent estant usée, la plaque
et qu'une dent comme osseuse et brisée, puis le raser mettant de dents crochues,
le qui n'arrive pas aux molaires à cause de cette base large et égale la

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
D. N.

et que la deuxième est dans une petite fente dans la racine de la première
voile, on ne peut donc pas dire de la nourriture des os et de leur
accroissement, mais il doit peu de chose de savoir cela. On ne tire pas
quelque avantage, pour les maladies, et c'est de cette partie d'anatomie que le
médecin doit recevoir plus d'usage, car plusieurs on pour mieux dire toutes
les maladies ont leur siège au cerveau, qu'on appelle quelles affligent, par
exemple les convulsions, mais il faut que la cause concorde, car dans les
poux, faire quelque maladie.

Je considère que ce que l'ulcère est aux chairs, la carie est aux os.
Car en effet ces deux maladies ont les mêmes causes et que les mêmes
mêmes remèdes leurs causes sont des humeurs salines, corrosives, et mordantes
qui usent à ronger les chairs ou les os y font solution de continuité qu'on
nomme dans les premières ulcères et dans les secondes carie, de sorte que l'un
et l'autre viennent d'un acide ou acrimonie du sang, d'où vient que l'apost
de miriol qui est un acide fait carier les dents et tomber en pièces les yeux
vermes fort rances au gravement, et cet acide est en general est adive
acide répandu dans toute la masse du sang comme une vermine ou vermine
à qui pour l'ordinaire les os se carient et se rompent deux mêmes
principalement aux des mâchoires à cause du voisinage des glandes salivaires
qui sont comme les réservoirs de cette humeur acide ou lymphatique acide, à qui
est prouvé par cette expérience qui est qu'on a remarqué que leur salive
ronge le bassin de cuivre ou les mathens ou enfin les acides particuliers
les acides attachés à certains endroits, et s'y trouvent ou par un long séjour du
miel adhérent ou ulcère en cette partie qui fait que les os de dessous se carient
comme l'arrivé quelques fois aux fistules muqueuses de l'anus ou de l'oreille
et les salivaires de l'arrivé, ou par le long séjour de la lymphe acide comme
à la fistule lacrimale, ou les ongles se corrompent et se pourrissent lorsqu'on a tenu
les os longtemps de couverts et exposés à l'air, car l'air se mêle insensiblement dans les
pores avoir le suc salin et faire exister les sels, ou par la froideur il peut
avoir reserré les pores des os, ce qui les fait exfolier sans de leur nourriture
ou par quelque coup, contusion ou meurtrissure, qui peuvent avoir corrompue
les parties, et le dérangement fait, que le suc salin s'adonnant les parties
les sels se séparent, ou que les os ne reçoivent plus de nourriture comme de coutume
ainsi, il se fêle et se carie ou enfin cette acrimonie vient du défaut de la
moelle, ou du suc moelleux, qui comme nous avons dit, adoucit non seulement
les fibres des os, et les rendent moins cassants en les rendant plus flexibles.

flexibles, mais qu'il corrige encore les acides de la partie saline du sang qui y est
apporté pour leur nourriture, de sorte que les fibres restent plus adoucies,
et les acides restent plus corrigés et venant à dominer, corrodent les os, les
perforient trop et les rendent inflexibles. On voit en ceux des vieillards, pour plus constants
que ceux des jeunes gens.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

La carie a non seulement les mêmes causes que l'ulcère, mais elle se guérit
encore par les mêmes remèdes qui sont le cause actuel, savoir le fer rouge,
l'acide volatil, et dissipe par le moyen du feu les particules acides du suc
nourricier, et les particules du fer se joignent au reste des acides, comme
il arrive aux préparations qu'on fait sur le fer, on se sert aussi avec
grand succès des cautères potentiels comme l'alun calciné &c. par la même
raison, et parce qu'on ne cela tous les liquides se joignent aux acides les
embarrassent, enfin tous les alkalis comme l'ardoise rouge; la marne
calcaire &c. y sont fort bons et tout ce qui est chargé de ces sels volatils comme
l'essence de la nœlle des clous de girofle &c. tout ce qui est acide y est contraire.

Ce n'est cette maladie vient l'ostéose qui n'est rien qu'une tumeur, et
élévation de los mais dure que le corps, ce qui vient de ce que le suc nourricier
venant cette humeur glauque ne coulant pas par les mêmes conduits
enfile d'autres voyes, et par conséquent croît dans d'autres parties et les enflant,
ou cela arrive lorsque par quelque coup ou toute autre cause que le
puisse être quelque tumeur de los qui porte le suc nourricier le bouchant,
ou rompu, ce qui fait que le suc venant plus de facilité à couler en cet
endroit y afflue en abondance, s'enflamme, on s'empêche qu'il ne s'en
pouvrait le faire qui y aurait obstruction dans les à l'exception de certains
endroits, ou par conséquent pour le suc nourricier destiné à la nourriture
de tous los, doit s'y porter, et faire par conséquent croître de manière
cette partie et y causer cette maladie ou tumeur qu'on nomme ostéose ou
enfin par quelque piquette faite à los soit par quelque corps externe
ou quelques sels corrosifs comme peut être les nodus dans les verols ce qui
fait boulever los à peu près de même qu'il arrive aux feuilles des
plantes qui ayant été piquées par des insectes se flétrissent et forment des bosses
qui pour l'ordinaire servent de domicile et de demeures à ces insectes.

La morsure qui arrive quelque fois cause et vient apparemment de ce que
le suc salin est trop adouci, soit par la trop grande abondance de la nœlle

de la moelle, ou autres sus huileux qui adouciscent que trop l'aigreur
et acide du sang, ou que le sang a très peu de sel, car alors la moelle qui
domine, passant entre les fibres de los, les adoucit si fort et les rend si flexibles
que les os deviennent comme moule ainsi que le prouve fort bien cette expérience
qui est que lorsque l'on met macerer quelque temps les pieds de porc dans l'huile
ils deviennent si mous et tendres qu'on les peut manger, la même chose
arrive aux bois des cerpes à l'ivoire.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.

Les calus qui se forment après les fractures semblent n'être autre chose que
la sue salin et nourrissier des os qui coule de deux extrémités des os rompus
qui s'agglutinent et s'attachent l'un à l'autre ainsi dire les os cassés, examinés
maintenant la moelle.

Les os qui sont creux contiennent une humeur huileuse qu'on nomme
moelle, et les spongieux une sue dit moelleux qui est de même nature que
la moelle.

La moelle n'est autre chose qu'un amas de vesicules très délicates, ou
de petits sacs qui courent les uns dans les autres enroulés et couverts dans
une membrane très délicate parsemée d'un million de veines et artères
et remplies d'un suc qui n'est que la substance, la plus grasse et oleagineuse
du sang.

On compare assez à propos, comme semble les os spongieux amples, et
ici nous appelons simplement moelle, et ce qui ne paraît qu'une
huile congelée à la moelle des plantes, il y a trois sortes de fibres ou
canaux, les premiers sont dits ligneux et portent la sue de la terre à la
moelle, ou il en est, les seconds font en forme d'aspersion pour
la sue nourrir du cœur à la circulation. Les troisièmes dits poreux
ou bronches portent l'air et la moelle et ne sont autre chose qu'un composé
de vesicules qui contiennent l'air, ainsi dans les os spongieux, on
remarque le suc moelleux des vaisseaux qui y portent la matière,
on a vu la partie la plus saline du sang d'autres qui la déposent,
et enfin les fibres osseuses qu'on peut comparer aux ligneux et la
moelle en son fait semblable à celle des plantes avec cette différence
pourtant que les plantes se nourrissent de la moelle, et les os de la partie
la plus saline du sang qui est ce qui paraît et sort de los ou au peu
ou qui se réduit en caillots ou petits os durs et semblables à de la corne
Voilà une chose qui fortifie beaucoup et prouve que la moelle
contient le suc le plus précieux de tout le corps, et fait bien voir



... les uns sont plus communs que les autres, et les uns des usages dissimulables
... les autres sont plus communs que les autres, et les uns des usages dissimulables

la nouvelle - la nouvelle est la version des os les plus légers, durs, flexibles

ACQUITTANCE 10/11/55

CHAPTER 44

۱۰

84E L. quoye. Car les nouvelles venant plus léger car le fait avec plusieurs

Leur aspect semi-circulaire et les corps creux sont plus durs que les autres segments.

grande variété. Le plus commun est l'humide, on en trouve sous les rochers, dans les

ce qui conséquens moins cassant, car le suc d'Epine Noire qui est tout en eau,

l'amorale passion, entre le corps et le monde par la jouissance de lui-même.

les humides et les vend plus plus bleus, flexibles et moins cassants, au cepie

la mécanique s'élève fort bien, quand elle fait bouillir dans de l'huile d'olive

les de cette Commission, nous dirons au contraire les corps qu'ils veulent de

dur, d'une flexibilité moindre que les autres, et les poutres en fer

les bannis & d'ouïr que les vieillards enqui cette humeur manque aux b.

01. Louis Cassius. L'oeil du ne passant à la corde les fibres des os corradouctum

pour la harmonie de leur jeu l'ont perçus & vus des 4^e & 5^e ainsi

enquêtant qu'il ne leur pose la même question, a fait qu'il a l'air d'un

pris de la même manière que ces vieilles branches durs & rompus

Saint de Senne - les autres y sont souvent intéressés.

Dominants et les humeurs huileuses de faillies.

ou que la sue puisse passer les fibres des os ^{et} les enlève dans une masse qu'on
obtient dans les squelets. On après avoir tiré la moelle en les avoir

fait bouillir, on voit qu'il y a succession de temps; et en bon un certain

que que la chaleur de l'air fait fondre et briser des os comme une voûte

Lequel les noirs, ainsi, et faut donc bien que ces gens aient les fibres des os

et que par conséquent il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

voilà les usages bien considérables que la melle machine sert

à quelque chose de plus grande importance; la nouvelle est donc aussu

balistique et très épuré sur l'après avoir été opéré de la manière que

vous venez à 2 h. 1/2. Les hommes s'occupent de la machine du dandy

elon les lois de la circulation sanguine de même en pour les muscles,

va-t-on que l'homme a pour but de se faire un nom, d'être connu, d'être apprécié,

... pour amener à admettre l'existence d'êtres qui se multiplient

Sans doute. Il n'en est pas empêché par cette dernière circonstance.

on peut dire encore quelque chose de plus: en faucon de la nouvelle, car

Comme c'est quelque chose d'exceptionnel. Scyllus est un pré-

ROYAUME ROYAL
DE
CHIRURGIE

et la graisse y enroit apportée, les adipeux pour corriger et adoucir l'aigreur
des sels qui se combinent dans l'os et les humeurs empêchés par cette
substance douce et grasse. on peut dire encore quelque chose de plus en
faveur de la moëlle, car comme on a quelque chose d'incompréhensible
de plus que la graisse, on doit soupçonner qu'elle des usages plus
spéciaux, et il ne semble pas de raisonnable de dire que quelque chose
d'aussi huileux volatil et balsamique, se trouve dans la masse du sang
pour entretenir toute pour ainsi dire et produire quelques-uns des mêmes
effets que ceux de la graisse verte tant vantée par les anciens et dont
ils nous ont tant de fois expliqués la nature et l'origine.

On ne doit pas prendre tout ce que nous venons de dire pour une
vérité inflexible, mais seulement pour une conjecture qui paraît
assez bien fondée sur la raison. Pour mieux en rendre l'idée, on peut
par son moyen deux instances.

La première est que les longues maladies qui dépendent du venin qui
se trouve dans les humeurs et qui se étendent enfin sur les parties
les plus intimes, et les plus nobles, et malades d'ice sont pour la plupart
sans remède incurables, lors qu'ils ne parviennent plus de ces degrés
la vie se perd, et c'est ce qui se voit si souvent dans les commotions
et pendant que le venin se trouve infecté que la masse du sang est
et les humeurs pour la circulation, et par conséquent les parties
qui en ont le plus besoin, et y a une grande quantité de venin
les adipeux que le venin a gagné au qu'il a moëlle, lequel ne se peut
faire qu'en un temps assez considérable, au moins que la nature
du venin ne soit extraordinaire, parce que la circulation de ce venin
est lente et difficile, et alors il est presque impossible que la maladie se
guérisse et depuis quinze fois ce que si plusieurs ont atteint et couronné
il n'y a guère d'espérance de guérison et encore moins d'une guérison
la seconde est que souvent parvient par la nature des humeurs
de la moëlle et qu'il n'y a rien de si vrai que la moëlle qui
se trouve dans les os des vieillards qui meurent d'une
vieillesse avancée, ne plus qu'une masse d'huile et de venin qui
a perdu toute la continuité de son existence, il ne faut pas donc s'étonner
si les gens meurent faibles de chaleur naturelle, on peut dire que leur sang
a perdu son huile et les esprits, et qui par conséquent les rend incapable
de soutenir la fermentation, mais les vieillards reviennent à la même
chose et soit que ce suc moëlleux soit rapporté vers le sang ou non, il est
toujours vrai de dire que sans que la moëlle exerce une bonne existence on

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

on ne peut point d'une extrême subtilité, et pour conclure en un mot, il y a plus
d'apparence que les os sont faits pour servir et soutenir cette substance volatile
et facillie que cette même substance n'est faite que pour les soutenir.
Mais maintenant expliquons pourquoi les os commencent à s'élargir et s'épaissir
par leur milieu et leur centre, ou ils sont toujours plus durs, et pour cela supposez
un os qui a une égale quantité de matière partout, mais qui est
plus comprimé dans le milieu, il s'en suit de là que mesure que les os commencent
à s'épaissir par leur milieu et leur centre, ou ils sont toujours plus durs et s'épaississent
cela se fera bien plus manifestement en cet endroit qu'en aucune autre partie
ce qui est fort convenable aux usages des os, et fort nécessaire, car comme
on voit par expérience que l'os de tibia dans toutes les parties il résiste
au moindre effort, il s'en suit donc que la nature a été reconquiesse en ce point
extremité par la solidité du milieu, elle a donc fait le milieu creux, mais fort
solide au contraire les extrémités sont faites de petites fenêlles couchées les unes
sur les autres et sont plus et fort larges, ce qui reconquiesse la solidité du milieu
et cette largeur est beaucoup dans tous les mouvements, car comme nos os
sont le soutien, la base et le fondement de tout notre corps, et de tous les
équilibre de tout le corps, il s'en suit qu'il doit avoir des extrémités
plates sur lesquelles on puisse appuyer sur eux, et servir de soutien
mis hors de leur centre de gravité, et la raison de cela est que plus les
extrémités des os sont plates et larges, plus la base ou ils s'appuyent est
anglée, et adhérente, et plus cette base est grande, plus la ligne de direction
se multiplie, ainsi les os sont plus durs et de même plus fermes, car il ne peut
tomber que la ligne de direction ne sorte hors de la base, elle est encore abaissée
des os et des cavités qui ne se pourroit pas facilement faire dans une
petite extrémité, ce qui est fort nécessaire pour nous donner une ferme assise,
car si les os n'étaient point que sur un point à la moindre violence ils seroient
déplacés et lésés. 3° os qui sont éloignés du centre de gravité les muscles qui
y sont implantés peuvent tirer avec plus de facilité 4° pour la plus facile
implantation des muscles. 5° cette largeur se vend plus forte dans une grande
quantité de matière, mais comme il faut que le corps de l'os soit encore plus
fort que les extrémités, car pour l'ordinaire nous le voyons par le milieu
de l'os, la nature y a mis la solidité en ramassant au dehors toutes les
fibres osseuses qu'elle a extrêmement et continuellement serrées le plus qu'il
est possible et a fait le milieu creux et rempli de matière de sorte qu'elle
a fait un cylindre creux, ce qui augmente merveilleusement la résistance
de l'os d'autant que le tenir de existence est augmenté.

Tous les os excepté les osselets des oreilles et les dents sont creux, par rapport
à l'exception des endroits où ils s'insèrent, et sont bœffés pour éviter la
douleur que le continuel frottement d'un os sur un autre en produiroit,
mais dans ce point est d'une nature fort serrée, et d'un sentiment fort exquis
de telle sorte que non que le développement des tendons des muscles, elle est
partagée de beaucoup de nerfs, artères, et veines, dans les os qui portent la
nouvelle et le mouvement, d'autres pour la substance de l'os pour la nourriture.



en verser dans la Cavité ou cellule laminaire de la moelle comme nous avons dit, comme la substance intérieure du crâne est nourrie par les vaisseaux qui viennent par la dure-mère et l'externe par ceux du péricrâne, ainsi dans tous les os comme par ceux de la moelle, la surface intérieure est nourrie par les vaisseaux qui courent sur la membrane qui recouvre le dedans de l'os et venant toutes les cellules de la moelle l'extrémité est nourrie par l'usage du péricrâne par la voie des vaisseaux.

Après avoir examiné la nourriture la production & des os en general il faut nous en venir à ceux d'usage articulaire afin de pouvoir descendre dans le particulier, mais auparavant de tous deux nous leur coter leurs parties dont nous avons besoin pour bien entendre leurs embêtements.

Les parties des os sont trois une principale & deux moins principales, la principale ditte diaphyse est le milieu ou corps de l'os qui rendroit le premier, les moins principales sont jointes à celle-ci & sont les extrémités qui sont ou apophysites ou epiphyses.

Les apophysites sont des éminences ou élévations de l'os même, les epiphyses sont comme qui de voit quelque chose d'adhésif à l'os car les articulations qui sont jointes aux os sont plus longs & empêchent qu'ils ne se frottent les uns les autres, mais comme les epiphyses ne pouvant pas se joindre intimement à l'os, la nature a mis de la corne en d'autre de minuscules os des cavités qui se reçoivent réciproquement & fait le jeu de l'articulation que nous appellerons un os ou un greigneur comme nous dirons dans la suite, il y a encore plusieurs ligaments qui servent à tous ces carriages, les fémurs, il faut remarquer que toutes les apophysites dans les jeunes sœurs sont epiphyses, & les epiphyses sont apophysites dans les vieux.

Les différences des apophysites & epiphyses se tirent de deux choses l'une de leur figure & de leurs usages.

De leur figure les unes sont rondes & sont faites pour se joindre à d'autres os comme celle du fémur, les autres sont mastoïdes ou en apparence ditte condyles, comme celles des phalanges, d'autres sont longues, ditte cotes, ou enfin finissent en pointe seulement & sont ditte acrochies, à cause qu'elles ressemblent à un doigt ou d'une base large & terminée en pointe, & on les nomme mastoïdes ou elles ressemblent à une dent & alors elles prennent le nom de dentoides comme la sixième vertèbre du cou ou elles ressemblent aux ailes de charbon & sont ditte pterygoïdes, ou enfin elles ressemblent à une épine, & on les nomme spinieuses, comme les vertèbres, nous pourrions ajouter leur situation, car les unes sont droites les autres obliques & enfin d'autres sont courbées comme aux vertèbres, de leur usage quelques uns sont ditte trochanters parce qu'en elles s'insèrent les muscles rotateurs de la cuisse.

Les usages des apophysites & epiphyses sont de servir à l'articulation.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

a l'articulation, de donner origine et insertion aux muscles et aux ligaments, de rendre les plus longs, plus légers et plus forts elle rendent les plus longes que le tour des os adonnées a les rendre plus forts et les rendent moins cassants, et plus capables de résister aux coups par la multiplicité des pièces qui présentent d'unantage que nous pourrions plus au long plus bas, et enfin elles le rendent plus léger par leur spongieuse, elles servent encore en augmentant le tissu de muscle a augmenter merveilleusement la force, et ainsi a épargner des efforts animaux et les faciliter l'allochemens enfilant et d'un facile aux efforts de la main, voire que pour cela elles sont cartilagineuses sans le fort, leur union avec les os permet qu'une portion du membre s'introduise et s'insère entre deux os par le moyen plusieurs vaissaux sanguins et lymphatiques pour porter la matière de la nouvelle osse de l'os, et celle de la nouvelle, enfin il en sort des ligaments comme nous avons remarqué qu'ils sont extrêmement ferres, et même ossifiés, quand les épiphyses sont une fois devenues apophyses et unis à l'os qui augmente prodigieusement la fermeté des ligaments et par conséquent celle de l'articulation.

On a l'habitude de mesurer entre les parties des os leurs canalis qui sont de plusieurs sortes. 1° des canalis proprement dits ou se font les articulations et sont ou profonds comme a l'ischium ou superficiels comme a l'omoplate etc. 2° des canalis qui sont dans les os pour conserver la moelle comme dans l'humérus. 3° des canalis perçant les os par et par en ligne droite ou les agissant sous comme au crâne. 4° des canaux percés d'un bout à l'autre, mais obliquement faisant quelque chemin dans l'os, il en est de l'os comme l'os cubital etc. 5° des canaux en serpentine comme dans l'oreille. 6° des canaux de deux et d'un os une dure petite entrée dans un plus large comme au coronal et celle s'ouvre en surface de l'os comme dans l'épiphyses. 7° des canaux enfoncés en considérable dans l'os, mais d'un bout à l'autre fort large d'un bout étroit, il en est de l'os comme a l'orbite etc. 8° des canaux ou fentes, si comme une lamelle qui se trouve entre les os qui sont soudés sur la surface de l'os comme en la cavité inférieure des os qui se trouvent la même lamelle et la même fente. 9° enlanchure par laquelle le tendon de quelques muscles comme a l'os de l'humérus ou par une des veines du bras etc.



Le corps des animaux est fait d'un assemblage de plusieurs os joints ensemble différemment ensemble est ce que l'on appelle articulation, il en fait d'un assemblage de plusieurs pièces 1° afin de se pouvoir mouvoir plus librement, et en tout sens. 2° pour résister d'unantage aux coups, par la raison dont l'on a vu que le os dans les ouvrages pour rendre les choses moins cassantes, et la même de cela, est que l'assemblage rend les choses plus fortes, et fait qu'elles résistent aux efforts elles résistent d'unantage, chaque partie dans l'assemblage est composée ayant son mouvement particulier, soit petit et limité, mais tous les mouvements joints ensemble quoiqu'ils soient petits font une somme

LIBRAIRIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N.

movements de flexion et d'extension, mais toutes ensemble par la
combinaison de tous les mouvements sur celui de tous sens, est ce qui se voit aussi
dans la machine qu'on a fait pour soutenir les bourses dans les nausées ou de
jeux ginglymes, il résulte un mouvement de tous côtés, cette machine est composée
de deux cercles dont les pôles se coupent à angles droits et sont rivés par ginglyme,
c'est ainsi que se fait quand le ginglyme est fort lâche, et les bourses et l'anneau sont
plats et superflus. Comme aussi dans le fémur et aux autres os qui ont
le mouvement de tous sens quoique articulés par ginglyme.

La mécanique a imité ces deux articulations anciennement sans
égard de leur structure que de leurs usages qui est de permettre à un os de se
tourner en tous sens dans l'arthrodie ou enarthrose et dans le ginglyme ou lux
donner la liberté que de faire le mouvement de flexion ou d'extension, la première
est nommée de nom ou en particulier aux instruments de mathématique
ou la seconde d'une égale facilité de se tourner de tous côtés la 2^e est dite
charnière quand deux pièces se rejoignent mutuellement comme aux volets
de fenêtre etc. et non que la seule flexion ou extension, au moins que comme
nous avons dit de plusieurs charnières ne résulte un mouvement de tous sens.

Mais on me dira dans la charnière, il y a une cheville et on en voit point
dans l'articulation des os joints par ginglyme, à cela je réponds que la cheville
ne fait point l'office de la charnière, et on verra cela un peu en considérant les
cartilages et les ligaments comme des chevilles dont ils font véritablement
l'office.

Après le diarthrose soit la synarthrose ou articulation sans mouvement
dont les anciens ont encore fait de trois espèces suture, harmonie
et gomphose, suture est quand deux os se joignent par engrenement par
plusieurs petites éminences et cavités qui se rejoignent mutuellement, harmonie
quand deux os sont joints par une seule ligne perlinguée et sans sautoir, comme
ils le sont en gomphose quand un os est fiché dans un os comme une
cheville dans du bois.

Mais si les anciens se sont trompés dans la division de la diarthrose, ils
ont tombés dans une grande erreur beaucoup plus grosse dans la division de la
synarthrose, car au lieu de harmonie ou engrenement, suture et
imaginaires chimérique, l'art a dans tout le corps de l'homme et des
autres animaux à aucune espèce d'articulation les os joints par
un simple attouchement ou ligne, comme ils le font dans la colonne vertébrale
voir aux os de la mâchoire supérieure qui se joignent pour exemple
car ils ont sous comme ceux du crâne plusieurs petites dents et cavités
qui se croisent, et se joignent comme des dents et forment l'engrenement.

Il y a encore que deux sortes de synarthrose suture, et gomphose
et nous savons tout à fait l'harmonie comme fautive, imaginaire et
ridicule.
La suture ou engrenement est comme nous avons dit lorsque les os se
rejoignent par plusieurs petites éminences et cavités qui se communiquent



ACADEMIE
DE
CHIRURGIE
N.

communiquent en façon de fic. comme ce sont deux par le moyen de deux dents,
ou comme nos doigts quand nous joignons les mains en les croisant les uns
avec les autres, cette espèce d'articulation a été imitée par les artistes en
cette jonction de deux pièces qu'ils appellent par qu'une d'aroudelle, ou la lanière
qui se fait en fort étroite par la base, et large en son extrémité, et la seconde
est un contraire en largeur par la base, et étroite en son extrémité, l'une dans son
extrémité.

La gongphote enquant un os en enchassé dans un autre sans mouvement,
de même qu'une cheville ou clou dans du bois, et il n'y a que les os du crâne
qui soient ainsi articulés avec les mâchoires par le moyen des alvéoles ou
elles sont fichées.

Il y a deux premières espèces d'articulation, savoir d'artrose et synostose.
Les anciens en admettoient encore une autre qu'ils appelloient amphiarthrose
ou neurve, par lequel, dit-on, elle se voit de deux, mais elle est fautive,
inutile et ne sert qu'à embarrasser les esprits puisqu'on voit les os du crâne
et ceux qui ont été dit être unis d'articulation ont un mouvement à la vérité
obscur, mais assez évident et manifeste pour qu'on peut les appeler leur articulation
arthrodie ou ginglyme à cause de leur saillies et cavités.

Les anciens reconnoissent encore une autre espèce d'articulation dite
symphise ou union de deux os en cela différente des autres qui n'estoit
qu'une jonction d'os, et non une union, et il leur faut double savoir
l'une sans moyen, et l'autre avec moyen.

La symphise sans moyen est une chimère, et tout le monde peut voir
que c'est une folie car tous les os qu'ils disoient être ainsi articulés ou
plus ou moins unis comme les épiphyses &c. sont tous articulés par synostose
de la 1^{re} espèce, à savoir par suture ou engrenement, le qu'on voit en la
de bas dans les os des os et on y remarque des saillies et cavités
plusieurs en saillies et cavités de part et d'autre, de saillies de cavités
lesquelles s'engrenent mutuellement comme les dents de la suture, en telle
manière que les éminences d'un os s'entrent dans les cavités de l'autre
dans les saillies et les éminences des épiphyses sont en saillies dans les cavités
des os, le qu'on ne sauroit mieux voir que dans l'espect d'une suture
sèche en de bas dans les épiphyses, mais à mesure qu'on voit les os de nouveau
recouverts, tendus et unis, de sorte qu'il semble que ce ne soit plus qu'un
même os et on voit les os, et les regardant dans les adultes on croit voir
un seul os, et on ne voit jamais qu'ils aient été séparés.

Il y a trois sortes de symphises avec moyen la 1^{re} par les nerfs dite
syneurose la 2^e par les chairs et la 3^e par le cartilage.

La syneurose est fautive, car il n'y a point d'os qui soient joints par les nerfs
unis par les membranes ni par les nerfs comme les précédentes, le qu'on
n'a vu en la ressemblance humaine, car les membranes qui sont
aux enfants ne sont autre chose que les os en la même manière comme
on voit dans la suture par leur endurcissement, et ainsi la articulation

articulation n'auroit pas lieu, amoins qu'on ne tende, et ne vult dire que
comme les os sont au commencement membraneux ensuite cartilagineux, et
enfin osseux, ils sont joints par des membranes, ou par le genre osse qui n'est
qu'une enveloppe des tendons les ligaments, ou des ligaments qui à leur quelquefois
se changent en os abruide et solide, par qui on vult dire comme au
commencement les os sont unies avec les autres par le genre
de chair musculaire, ou cartilagineux, ou fibreux, ou par le genre de
matière qu'elle est jointe ligaments et éloignées à cause de la même chair qui
est entre eux.

à l'apophyse osseuse en elle est en la seule Symphyse de deux os qu'on
animans, elle se fait par le moyen d'un cartilage qui proémine de l'un et
s'enduit et devient osseux en peu de temps de deux os ne fait qu'un,
comme on voit à la Symphyse de l'homme au lieu des os qui sont
car en effet les cartilages sont les mêmes que les os de la nature mais
elle leur les voit être, elle met encore deux autres cartilages à l'apophyse
qui est un cartilage qui par sa densité les tient ensemble.

[illegible]

Il est beaucoup plus vraisemblable de dire que les membranes qui envoient
la sécrétion dans la cavité de l'articulation, soit quelle ayt esté
filtrée par les glandes qu'on ne sçait en core bien remarquer, soit quelle
separée du sang qui est portée par les artères de ces membranes tendineuses,
comme le lait contenu dans le péricarde et le sang, comme nous dirons
dans la suite.

Enfin quoy qu'en soit cette humeur estant une fort bonne pour le
débile, l'endurcissement et de viennent durs et ravaillés, ce qui fait que
pour lors on entend un bruit continu dans le mouvement lombaire



au bruit du frottement de deux pierres polies, acqui arrivent quelquefois
aux tournois ou verolés de dans d'un tournois.

Ces os par les des os en general, passent maintenant au cartilage.
le squelette en pour l'articulation d'un os avec un autre par le moyen de
les extrémités.

ACADEMIE ROYALE
CHIRURGIE
C

La tete est située au haut du corps afin que les organes des sens
soient en état de voir, d'ouïr, de sentir, et plus commodément exercer leurs
fonctions principales les yeux, qui font que nous voyons tout ce qui est
autour de nous pour apercevoir les objets nécessaires à notre conservation,
et pour en faire un fidèle rapport à l'ame, elle est divisée en crâne et
en face.

Le crâne est un assemblage de plusieurs os qui forment
une cavité pour renfermer le cerveau, le cervelet, et la moelle
allongée. Ces os sont la base de la face, la table interne,
la table externe, la voûte du crâne du mot grec *cranium* qui signifie
crâne.

La table externe est faite de plusieurs os pour les raisons suivantes, rendre
les incisions pour nous en servir. C'est adire pour être plus ferme,
plus fort, moins cassant, et résister davantage aux coups, et empêcher que
la fracture de l'un, ne se communique à l'autre et pour faciliter
la dissection comme nous dirons en parlant des os du visage.

Les os du crâne sont composés de deux lames osseuses qu'on appelle tables
l'une externe et l'autre interne et polie et l'autre interne est
inegale et raboteuse à cause de plusieurs petites éminences, enfoncements
et sillons qu'on prendrait pour les moules des vaisseaux de la
dure-mère, mais qui nous paraissent être creusés que pour le logement des
artères de cette membrane, et sous les traces et vestiges de ces vaisseaux et sous
dont ils s'élèvent, et représentent fort bien les ramifications d'un arbre
humain, mais dans les bœufs, l'homme pas de même, comme nous dirons en
parlant du cerveau.

Ces deux tables ont plusieurs fibres ou fibres osseuses qui forment
des cellules et apparemment on en a vu une substance molle, et poreuse
garnie de plusieurs canaux et une infinité de vaisseaux les grecs l'appellent
diptoe ou *diptoe*, qui signifie la moitié de quelque chose.

Le diptoe n'est en aucunement différent de la moelle des autres os comme on
pouvait le croire à cause de la couleur plus grande qu'il a de rouge
de laquelle reçoit plus de vaisseaux sanguins, et elle n'est pas d'un usage que
celles des autres os.

Ces deux tables du crâne ont été faites dures et solides par ce qu'il faut
que le crâne soit de défense au cerveau, mais comme il faut plus
qu'il lui soit à charge, par sa pesanteur, la nature a fait le milieu
poreux et spongieux la remplir de moelle, ce qui le rend non seulement
moins cassant, mais encore plus léger, que les ouvrages et mécaniques

mechaniques Rameaux sont bien misés quand ils emploient dans les voûtes des
simples et au haut des grands edifices de pierres poreuses et légères qui ne manquent
pourvu qu'on ne les coupe et de solidité comme la ponce et les grosses et solides
pour les fondemens et le bas du bâtiment.

La grandeur et figure du crâne répond au volume et à la figure du cerveau.
Il est évident si l'on se le crâne qui donne la forme au crâne ou plus tost si l'on
se le crâne qui façonne le cerveau selon la figure.

Les auteurs sont partagés là dessus, les uns soutiennent la 1^{re} et les autres la 2^e
mais qu'on ne puisse perdre de temps à examiner les raisons des uns et des
autres, nous dirons que comme la nature travaille également, et en même
temps pour la fabrique de toutes les parties, on ne doit point dire qu'un le
cerveau ou le crâne se forme figurent l'un et l'autre, mais que leur conformation
depend du mouvement des esprits, et de la disposition naturelle. Il arrive
qu'ils se trouvent bien ou mal figurés tous ensemble, selon que les esprits
se font de servir de régulièrement ou irrégulièrement dans une matière bien
ou mal disposée, mais ce qu'il ne faut pas entendre, que pour le temps que l'enfant
est en matrice dans le ventre de la mère, et en cas qu'il ne lui arrive point d'accident,
car quand il vient au monde, une large fontaine la nourrice pénétrant, et
peuvent tellement lui altérer la figure du crâne qui est en core mol que
le cerveau ne peut sentir l'impression, et dans ces renforts on peut
dire que le cerveau se façonne selon la figure du crâne.

Hippocrate et Galien disent que la figure du crâne étoit de trois sortes
naturelle, non naturelle, et contre nature.

La naturelle doit être ^{de forme} oblongue en devant et étendue par derrière
et par derrière convenue par les costés et le crâne figure de cette manière
doit avoir selon Hippocrate trois sursures, savoir la sagittale la coronale
et lambdoïde.

Le crâne en avant pour couvrir une plus grande quantité de cerveau et pour
éviter plus aisément les injures extérieures, oblong pour s'accommoder à la figure
du cerveau, en devant et étendue par derrière pour couvrir les
lobes antérieurs du cerveau, et le cerveau comprimé par le front et les costés afin
de donner aux yeux, la facilité de voir plus librement de tous les costés.

Hippocrate fait de trois sortes de figures non naturelles, la 1^{re} quand
la sursure antérieure manque, et alors, il n'est troussé point de sursure
coronale la 2^e quand il n'y a point de sursure postérieure et par conséquent
point de sursure lambdoïde, et la 3^e quand les deux sursures manquent,
et alors les sursures du crâne manquent.

Il y a plusieurs auteurs qui ont prétendu que ces trois figures sont nécessaires
mais quand elles se trouvent quelques fois, il ne faut pas que parce que
la sursure antérieure ou postérieure manque, il ne faut pas, dire
que la sursure coronale ou lambdoïde manque.

Colombus assure qu'il a vu plus de 60000 crânes à Rome ou à
Florence, et qu'il n'en a jamais rencontré un qui manquât quelques



quelqu'un de ces auteurs, et on cette figure non naturelle averti bien marquée,
mais enfin il y a quelque apparence qu'il y en a eu un.

la figure convenant le long d'un esquand les deux eminences qui
doivent être devant le derrière le rendent moins accessible; mais le long de la même

Je ne saurais jamais ne te saluez et te dire bonjour. Bon jour mon imagination.

La connexion ou articulation de la tete, avec le Col de la
 tige de la pince de la pince enroulée.

l'articulation de la 1^{re} avec la 2^e est encore double la 1^{re} avec la 2^e vertèbre du col qui est une double arthrodie qui doit le rapporter à la 2^e espèce de diarthrose quoiqu'il y ait les deux immenités de l'occiput sont reçues dans deux cavités de cette vertèbre, et ces ~~par~~^{pour} cette articulation qui la rendant les mouvements de flexion et d'extension en dedans et en arrière, la 2^e est avec la 3^e vertèbre du col par le moyen d'une petite apophyse de cette vertèbre qui est reçue dans une cavité de la 3^e vertèbre, et dans un petit enfoncement de l'occiput, et c'est par ce moyen que le fait les mouvements obliques ou d'arc circulaires de la tête laquelle, pendant un temps avec la 3^e vertèbre forme autour d'elle-même, d'où vient quelle n'est qu'un mouvement axial.

A l'égard de la dixième articulation de la resse au adire de la Connexion.
de nouer les différentes pièces les unes avec les autres, c'est à leur sur dir quelle
le fait soit par les 3 especes de quatuorces, à savoir l'heure, harmonie, ergonomie,
mais on doit bannir l'harmonie comme imaginaire, comme mensonge
provenant plus haut.

Tous les os du crâne sont articules par suture, que les antérieures ont des os
en communes et en propres.

les Communes basillaires qui se gravent ou pour mieux dire au bas des os
communs au crâne et à la face et sont trois en nombre, la 1^{re} ordinaire
sphénoïdale du nom de la quelle est son épigone sphénoïdale, la
2^e extraordinaire à cause quelle fait le tour de l'éthmoïde, et la 3^e trigonulaire
qui se grave à Trigoma en deux, et les autres os de la face d'avec ceux du crâne.

les propres selon les anciens tous voyez que j'en ai maint mal à propos,
puisque vous les os du crâne sont articulés par plusieurs poignées ou dents
en façon de dents de Rie au dedreignes, comme on voit dans les os rompus
qu'ils adhérent pour exemple à dix ou quinze dents articulés par des dentures faibles
et faibles ou qu'on les en fait de la tête de poisson de quille ou d'ongle
projetés comme sur les autres, puis qu'ils ont comme les autres os plusieurs
éminences qui représentent des dents de Rie qui s'enchaînent les uns avec
les autres par le moyen des canalis qu'ils ont dans leurs moelles et ainsi
font une impression ou figure unie.

les sutures propres sont donc toutes vraies et au nombre de cinq. Avoir
la coronale, la sagittale, la lambdoïde, et celle des os des tempes.

la Coronale ainsi dite a cause que les anciens parois des temples

dessus leurs couronnes, ou parcequ'elle leur ressemble. On remarque vers le grand angle de l'oeil une petite corne, et une seconde au sommet de la tête, dont elle fait le même chemin de la racine corné jusqu'au grand angle, et ainsi fait lequel les anciens -
se toient faire à la première commune qu'ils appelloient frontale.

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
Le **Triquetrum** ditte ainsi parcequ'elle a trois angles, et qu'elle a la figure d'une pique ou d'un triangle, à cause qu'elle joint les deux os parietaux en un même ligne de la fontanelle à la coronale et quelques fois la continue jusqu'à la racine du nez, de sorte de sorte de la coronale en ditte la fontanelle.

La lamelle ou vrilloide a cause de la ressemblance qu'elle a avec la lettre grecque λ ou v on trouve sous les occipitals, on remarque en icelle plusieurs petits osselets qui font usage de l'os pour mieux former et joindre plus exactement.

Les temporales mal à propos dittes et taillées d'origine. Les temporales avec les parietaux, les artériels ont en partie imités cette articulation en cette jonction de deux pieces qui se fait en mode d'ongle suivant leur langage, ou les pieces finissent en diminuant leur extrémité extrême taillées en biseau.

Usage de toutes les sutures est de joindre les os du crâne de donner passage aux vaisseaux du cerveau, et à plusieurs petits nerfs, les sutures ne sont pas si serrées qu'elles ne laissent toujours quelque issue, afin d'empêcher que la pression d'un os, ne se communique à son voisin, la violence du coup estant valant par la violence des sutures, pour soutenir la dure mere et les sinus, et faire adonner à tous les os qu'elle fait tenir la cloche, pour ainsi dire à toutes les pieces du crâne de chanceler les unes sur les autres.

On divise les os du crâne en internes et en externes. Les internes sont les quatre osselets des oreilles, à savoir l'os de l'oreille, le marteau, l'enclume, et l'incus.

Les Costeuses sont ou communs ou propres, les communs sont dits, a cause qu'ils servent et appartiennent au crâne et à la face, sont deux à savoir le sphénoïde et le maxillaire aux quels il seroit à propos de joindre le coronal, puisqu'il appartient pour le front et la partie supérieure de l'orbite, les propres sont six ou plus ou moins en joignant le coronal par les communs, à savoir l'occipital deux parietaux, et deux temporaux.

Le sphénoïde ainsi dit parcequ'il ressemble à un coin, et qu'il est en place comme un coin entre les autres, ou basilaire parcequ'il est à la base du crâne, et articulé avec l'occipital, les temporaux le coronal, et le maxillaire par la suture sphénoïdale, il est d'une substance fort dure mince en certains endroits, fort dur et épais dans d'autres et de figure et grandeur fort irrégulière, et difficile à décrire. On doit le regarder extérieurement et intérieurement en sa face extérieure, on remarque deux apophyses dittes pterygoides pour les de charne servent, deux autres dittes zygomatics qui le joignent au coronal et deux autres qui se rendent vers les os de la face des temporaux.



ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N^o 1

avec qui elles se joignent avec l'os qui est en la surface intérieure, & y a deux
anomalies pour les nerfs optiques & 2 apophyses antérieures & 2 postérieures, qui
cause qu'elles ressemblent aux pics d'un lit sous dits cloués, & une autre
cause un enfoncement et est formé ce qu'on nomme la selle du sphéroïde,
depuis cette selle les se divise en deux lames osseuses l'une supérieure, l'autre
inférieure qui laissent une cavité séparée en deux par une lame osseuse qui
est en bas, & est ce qu'on nomme les sinus du sphéroïde qui se rencontrent
avec les sinus des sinus, & lorsqu'ils manquent ils sont fort dangereux pour le
cerveau & le plus grande partie des vides de la base du
crâne, car il y a les deux pour les yeux, la fenestration ou passage
le moëlle, le parietique, la 6^e & deux branches de la 4^e & une autre pour
la 1^{re} branche & un trou pour la 2^e & un conduit pour la 3^e & une
intermédiaire qui vont passer dans le conduit des temporaux, une autre
pour la 4^e & une portion de la cavité externe qui va jusqu'à la dure
mère & fait une fort belle distribution & a remarque dans ces os dans les sinus
& partie la 1^{re} & la 2^e de la cavité de l'os qui est d'un doigt & la 2^e
comprend la selle du chérial, & les allongemens destinés aux nerfs optiques,
la 3^e & 4^e sont plus élevés, & sur dits apophyses temporales du sphéroïde quelques uns
neanmoins ne s'admettant que trois, la 1^{re} fait la base, la 2^e la selle & la 3^e
les apophyses prémaxillaires, mais aux adultes on ne voit qu'un seul, & est bon de
remarquer il y a un os qui se nomme os cotarve, & du couloir, parce que les anciens
crojoient que les os se joignent par les trous que la nature leur a donnés (pour le servir
de leur nom) se déchargent & couloir dans la bouche, comme à l'usage de la parole,
ce qui est maintenant sans commune nous démontrons dans la nature.
Le thymus de l'os qui se forme ainsi dit à cause qu'il est percé de plusieurs trous,
comme un cribble & est deux ossements osseux une dans le crâne, qui a
raison de la figure est dite crista galli, l'autre dedans le nez ou elle aide à former
la cloison, & l'os de crista galli sous de lames osseuses toutes percées de trous
pour donner le nom au trou de crista galli, & la lame de os cotarve
attaché un os qui prend dans la cavité du nez séparé l'un de l'autre par
la cloison des os nasaux, spongieux & osseux deux sur faces, une qui regarde
la base, & en fait une paroi, & spongieux, & l'autre la quelle les planum, l'autre
qui regarde la cavité du nez spongieux, & osseux & inégale, forme
plusieurs cellules, dont nous par l'os en examinant la structure du nez
et de toutes les parties qu'il y a à l'os.

Le coronal ainsi dit à cause de sa figure presque ronde & circulaire,
ou à cause que les anciens portaient dessus leur couronne de l'autre, ou
os du front du nez qui signifie front, & nez, parce que les os du nez qui
nous portent les marques de notre hardiesse, donnent qu'on dit en latin
homosine fronte, homosine pudore, & homosine prout, & en
français on dit un effronté, & l'os d'une substance médullaire
plus dure que les autres, & moins que l'os qui est le plus
grand de tous les os du crâne quelques fois pour d'une pièce & quelque fois
de deux par la suture sagittale, & a en sa surface l'os qui

quatre-vingt-cinq de chaque côté, une à chaque angle de l'œil qui par
 lequon nomme les *muscles*, au-dessus desquels sont deux *apophyses* de
 chaque côté, de chaque côté de la partie supérieure de la bête on
 verra une *apophyse* arrondie au-dessus de la *fontanelle* biconvexe par sa base une
apophyse une *apophyse*, et une *apophyse* de la *base* de la *base* pour s'élever


ACADEMIE ROYALE
 DE
 CHIRURGIE
 C

ou muscle *frontal* et une à la partie inférieure de chaque orbite, dit *orbiculaire*
 interne ou *muscle* d'un *vasculaire* de l'ophtalmique qui va au-dessus du *nerf* *trigéminal*
 et se termine en *lancinant* ou voit quelques *filles* et deux *enfoncements*, pour être les
 deux lobes antérieurs du *cerveau*, et une *enfoncement* entre les deux qu'on nomme
 la *creux* du *coronal*, on s'attache le *sinus* longitudinal supérieur à sa *origine*
 on observe un *trou* qui est à *proprement* par les *quatre* *fontanelles*
 ayant *quatre* de *sortie*, ou le *sinus* du *sinus* longitudinal supérieur s'attache
 et est *par* la que les anciens ont cru que le *sinus* se *décharge* dans le *cerveau*
 et que *celui* le *sang* quand nous *signons* *deux* *du* *cerveau* ce qui est *faux*, car
 il n'y a *aucune* *sortie* ni *embouchure* ni *même* *communication* avec le *cerveau* et
 le *sang* *rien* des *veins* *longueurs* de la *membrane* *interne* du *cerveau* comme
 nous *dirons* en *parlant* de *l'os* *coronal* et *de* *quelques* *autres* *qui* *sont* *beaucoup*
étendus à *deux* *sinus*. Sous les *fontanelles* se *trouvent* d'une *lame* *osseuse* *forte* *détachée*
 qui ont *pour* *but* *communication* *ensemble* à cause *qu'elle* *ne* *les* *separe*
pas *entièrement*, ils se *déchargent* dans le *cerveau* *chacun* de son *costé* *chaque*
par un *trou* *propre*, mais en *ceux* qui *ont* *plus* le *trou* *de* *deux* *ils* *ne*
se *peuvent* *ouvrir*, et les *est* *fort* *spongieux* en *ces* *endroits* comme nous
 nous *dit* *du* *sinus* *sphenoidal*.

Ollivier est un os fort dur et épais, inégal en sa partie extérieure
 pour donner origine et insertion aux *grands* *muscles* qui *servent* à *élever*
 la *tête*, c'est le plus grand de tous après le *coronal* de figure *rhomboidale*
 situé à l'opposé du *coronal* au *derrière* de la *tête*, il a la *forme* *de*
un *trapeze*, un peu plus inégal en *sa* *base* que les autres, pour donner
 comme nous avons dit origine et insertion au *muscle* *occipital* *sphenius*
complexe et on y remarque encore deux *éminences* à *côté* du *grand* *trou*
 ou *par* la *saute* de la *queue* plus *plates* que *voûtes* qu'on nomme *condyles*
 mais qui sont de *veritables* *condyles* par le *moyen* *desquels* se fait la *première*
 articulation de la *tête* avec le *col* les deux *éminences*, étant *recevues* dans
 les deux *cauités* de la *base* *nerveuse* du *col*, et sont *l'articulation* de la *2e*
espèce de *ginglime*, derrière les deux *éminences* sont à *chaque* *un* *trou*
par ou *passent* les *neurs* *nerveuses*, la *base* *passant* par le *trou* *occipital*
entre la *base* *nerveuse*, et *l'occipital* par au *tour* la *derrière* *par* *qui* *avec*
 la *base* *traverse* dans une *échancrure* de la *base* *nerveuse* au-dessus de la *base*,
 il *seroit* *une* *autre* *par* ou *passent* une *neure* qui va aux *sinus* *latéraux*,
 et fait *acte* *admirable* *communication* *entre* les *parties* *extérieures*
 de la *tête* et celles du *dedans*.



2
Elle fait aussi la principale partie du crâne, et forme avec le temporal
une cavité qui loge le cul de sac de la singulière, s'ouvre en deux bords du trou
occipital, un trou de chaque côté pour la 2^e paire qui est quelque fois
double. on remarque dans la face interne quatre enfoncements, les
deux supérieurs, les plus petits, servent à loger les lobes postérieurs du cerveau,
et les deux inférieurs les lobes du cervelet.



Les quatre enfoncements, sur lesquels les os se joignent, par une cavité
ditte creux qui a la forme d'un arc ou d'un arc de cercle le sinus longitudinal
supérieur celui de l'occiput et les deux latéraux, et à l'endroit ou les deux
derniers s'attachent, il y a deux enfoncements qui ont leur traces, ou vestiges
imprimés dans les os par leurs bords, si bien qu'on peut les voir que l'autre
et qui servent à faire garder aux sinus latéraux leur figure de S.
Proxima est os occipital avec les parietaux et temporaux par la
lamboïde et s'engrènent avec le sphénoïde par la sphénoïdale.

Les parietaux ainsi dits, ont une cause qui les soutient ou à cause qu'ils
sont les parois de la tête, ils sont dits bregma des grecs, par ce qu'ils ont une
cause qui les soutient sur la partie la plus humide du cerveau ou sur la dure-mère,
à cause qu'en cet endroit il y a une tumeur ou un gonflement, ou en fin d'un joint,
à cause qu'ils sont le haut et le bas de la tête, ils sont deux en nombre,
un de chaque côté joints ensemble en leur partie supérieure par la
suture sagittale, avec le coronal, par la coronale, avec l'occiput, par la
lamboïde, et avec les temporaux par la caillasse, et ainsi ils sont de
deux dans toutes leurs conférences, ils sont taillés en biseau ou ils
se rejoignent avec les temporaux pour ne point faire une trop grande
épaisseur, ils ont la figure à peu près quarrée, et sont plus grands
que les temporaux, les plus petits que l'occiput et plus faibles de tous, selon
l'hyppocrase des playes de la tête, on y remarque en leur partie supérieure
quelques fois un ou deux trous par ou passent des vaisseaux artériels
qui vont du petit cerveau à la dure-mère, par où ils vont, et ainsi on voit une
admirable communication entre les parois, leur surface externe
est fort polie et égale, et l'intérieure remplie de sillons et traces de vaisseaux
de la dure-mère.

Les temporaux ainsi dits, ont une cause qui les soutient, c'est que les chemins
commencent à se former en cet endroit, sont dits ainsi de chaque côté à
la partie latérale inférieure du crâne, au dessous des parietaux
avec qui ils sont joints par la suture caillasse et avec les autres os
par la sphénoïdale, et la zigomastique, ils sont les plus petits des os propres
du crâne et d'une figure ovale selon Galien, et selon les modernes
ovulaires à cause de leur direction de substances ou les dits en deux
parties qui sont séparées dans les enfants, à savoir en partie supérieure
qui est osseuse et en partie inférieure qui est cartilagineuse, et en fin d'un joint avec
les parietaux du ou la suture caillasse, ou suture menue, supérieure
beaucoup plus dure et dite parieuse, qui est fort raboteuse, on y remarque

Remarque est unie avec deux apophyses, une longue qui finit en pointe
ditte qui se joint au maxillaire, l'autre beaucoup plus courte et obtuse ditte maxillaire
et aide à la respiration, quelle est une mamelle de dent, la 3^e enfin
laquelle joint le maxillaire par la suture zigomatique avec le prolongement de
la maxillaire pour former une voûte au dessus le crâne qui se nomme
Ligament, sous cette apophyse vient le nom, on y remarque encore
une cavité superficielle qui reçoit le conduit de la mâchoire supérieure
de l'os de l'oreille, le conduit osseux ou par le maxillaire, le nom que
nomme l'os. On voit entre la maxillaire maxillaire et l'os de l'oreille de quoi se passe la
portion dure du nerf auditif, il a un autre trou qui est commun à
l'œil, à qui il appartient plus qu'à lui par ce qu'il se passe une branche
de la maxillaire externe qui se rend au sinus latéral, il y a aussi à former
le trou de l'oreille, et une cavité on pose le bulbe de l'os de la maxillaire interne,
cette maxillaire inférieure se trouve dans une apophyse qui vient le nom
de l'os maxillaire, on voit l'os des osselets des oreilles, et tous les autres
os de l'oreille, on y remarque un trou par lequel le nerf auditif
sans nul que dur le conduit qui va de l'oreille au fond du palais dans
la voûte.

ACADEMIE ROYALE
DE CHIRURGIE
C. N.

La face ou visage deuxième partie de la tête de l'homme en mâchoire
supérieure et inférieure.

La mâchoire supérieure est immobile à tous les animaux excepté
le seul perroquet pour les autres on dit quelle est mobile et
mobile, mais ils se font tourmenter pour les osselets du dessous
demeurent dans cet animal, autrement il n'aurait fait quelle osse
en une articulation avec la crâne, comme à se du perroquet cependant
toutes les pièces se joignent entre elles, et avec celles du crâne par des sutures,
de même que dans l'homme qui pour quelques fois se joignent qu'il en
parait pas, mais voyez ce qui a fait tomber les osselets de l'homme
à l'usage de fléchir les choses, seulement on de les examiner
fort grossièrement dans l'homme, après l'avoir à deux fois dit que la
mâchoire supérieure du crocodile s'ouvrait, et qu'il ouvre la bouche
fort grande, et qu'il est en même temps à l'usage de l'oreille, de sorte que
n'examinant pas la chose d'usage, voyant mouvoir la mâchoire
supérieure qui suit le mouvement du crâne, il en attribue le
mouvement de mouvoir la tête à la facilité de retirer la tête pour
en arriver par le moyen articulé avec la tête, le membre du col par
articulé, les osselets n'ayant qu'un point, mais que dans l'homme il y en a
deux, or la mâchoire inférieure est articulée par gingivine, d'où vient
quelle n'a que le seul mouvement de flexion et de tension et à la fois
les raisons que nous devons dans la tête la mâchoire supérieure
est composée d'un os, cinq de chaque côté et un impair sans
comprendre les dents, tous osselets articulés par nature un par



non par harmonie, et les dents par gomphose

Le 1^{er} des onze os dit unguis a cause qu'il est de la figure d'un ongle
situé dans l'orbite au grand angle de l'œil, il a un canal qui va dans l'œil
donc il prend le nom de canal nasal, les anciens ont cru que l'ongle
lacrimal inférieur étoit d'une autre os, mais cela est faux, puisqu'il
ne se renouvelle point dans l'homme, comme nous le voyons en temps et lieu;
seulement le lacrymal qui y repose d'où on nomme ces os lacrymal
supérieurs parce que c'est en cet endroit qu'on fait la fistule lacrymale.

Le 2^e dit quarré a cause de sa figure fait la partie supérieure d'un
joint au coronal par la suture d'un os même nom, et par en bas avec deux
autres l'os sup. d'alto, ce ensemble forme les parois du crâne la partie
supérieure.

Le 3^e dit procerus, les maxillaire, ou la mâchoire fait une partie
du fond du crâne, la partie inférieure de l'orbite le commencement du
palais de la bouche, et à plusieurs alvéoles, on est enchaîné la moitié
des dents de la mâchoire sup. Cet os a un sinus qui se rend vers le nez
comme nous le voyons en partant de l'os du nez, il a un sinus vers les dents
inférieures qui est le commencement d'un conduit qui mène le sang et
entièrement à un os dit maxillaire, et plus haut un os dit
orbitaire externe, les animaux carnassiers ont un creux enfoncé dans
dans cet os pour loger leur masseter qui est effroyablement gros et épais.
Le 4^e os dit malum ou de la pomme, ou le dit os communément
en 4 parties ou allongement, le 1^{er} est la pyramide qui se joint
avec celle du nez pour former le 2^e os dit os max. Le 2^e fait le petit
angle de l'œil, le 3^e une partie de la partie inférieure de l'orbite,
le 4^e la rondelle de la voûte de la pomme, qui lui donne le
nom de malum, parce que hypocrates appeloit la voûte du nez, troupeau
qu'elle ressemble en figure à l'os d'un homme dans les gens
qui se portent bien, on y remarque quelques fois deux trous.


Le 5^e os dit petit os qui forme le fond du palais vers la luette d'où
viennent qu'il est appelé os du palais, quoiqu'il ne soit qu'une plus
grande partie que lui.

L'os maxillaire a vu son de sa figure et de sa forme au bout de charnière
os dit vomer situé dans le nez posant par une de ses extrémités sur
l'apophyse, par l'autre il se joint par plusieurs dents à l'os maxillaire
à l'endroit où ils se joignent tous deux, puis s'adonne dans le nez
le divisant en deux et cette partie est le long d'un os dit une
os maxillaire ou suture dans laquelle se mêle la cloison du nez
sans ostéose que l'os maxillaire qu'on pourroit mettre au nombre
des os de la mâchoire aussi bien que les maxillaire, dont nous avons
parlé cy dessus. La mâchoire.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N. 11

La mâchoire inférieure jointe avec les os temples par arthrodie
ou enarvote dans l'homme, et autres animaux qui ont les dents ^{de l'homme}
disposées, celles posées les unes sur les autres, est adive que celle de la
mâchoire sup. envoient dans les espaces de celles de l'inf. esquisse parallèlement
celles des inf. envoient dans les intervalles. De celles de la sup. esquissent
leurs dents se croisent comme dans le crocodile et dans esquisse en une
les natiens. La mâchoire inférieure est articulée par vingt-deux
articulations quelle n'a que le seul mouvement de flexion, ou d'extension
l'addition, quelle ne peut que s'ouvrir et fermer, et ne s'aurait le tourner
à côté, et ce la a dû être ainsi, car en effet si elle voulait comme
dans l'homme et autres animaux qui ont le pain de mouche les
aliments, les animaux de l'arctique, et les serpens des dents à cause
qu'ils ont des dents, les dents de chaque os les unes contre les
autres, et enfin ils se déchireraient les uns, et les gencives, elle
est faite dans les enfants de deux os qui sont réunis dans les adultes
par le moyen d'un gros cartilage qu'on ne trouve qu'un seul
lequel est blanc et lisse dans l'homme à la différence des autres
os qui ont le milieu long comme ^{appelé de} la langue que
quelques uns ont pour passer pour celle de géant, il y a une éminence
qui la distingue, on remarque le menton, ou symphise de chaque
côté la partie qui est vers le bas de l'angle, et celle de la base de
la base, à l'angle on observe deux apophyses une condyle
qui fait articulation avec les os temples, et l'autre s'élève un
s'attache le gros tendon du puissant muscle cricothyroïdien à la base
il y a intérieurement un grand trou qui est l'ouverture d'un canal
creusé dans ces os par un gros nerf, une veine, et un vaisseau
la veine se de gorge dans la jugulaire inférieure, l'artère va dans la
carotide externe, le nerf de la mâchoire inf. 3 branches de la 3^e paire
du cerveau qui se divisent plusieurs fois à chaque dent pour leur
nourriture et sentiment et peut sortir par un petit trou qui est
dans la surface ext. de la base de ces os proche la symphise du
menton, ou ils vont se distribuer aux chairs, mais il faut remarquer
il y en a plusieurs qui passent de l'os, ils ont plusieurs ramifications qui se
continuent dans le canal jusqu'à la symphise pour les dents dentures,
on remarque dans cette mâchoire aussi bien que dans l'autre plus
trous ou alvéoles ou des dents sont fichés.

Nous avons examiné plus haut, la génération, nourriture
des os, leur production ou sortie des dents les acides qui les
accompagnent et leur régénération par les ossements de leurs



deux différentes usages.

La bouche de l'homme est armée des dents de différente grosseur & figure, qui sont pour l'ordinaire sept à chaque mâchoire & qu'on divise en trois espèces suivant leur situation, canines, & molaires. Les incisives sont quatre à chaque mâchoire, situées en devant, plates & transparentes un peu concaves par dehors & sautes par dedans, les canines sont deux à chaque mâchoire, une de chaque côté, elles sont rondes & pointues par le bout & nous pour l'ordinaire on les appelle dents de chat, les molaires qu'on appelle communément deux, on les nomme encore molaires, par ce qu'elles sont situées sous l'œil.

Les molaires sont cinq de chaque côté de la mâchoire & sont pour l'ordinaire plus grosses & inégales & leur superficie fort irrégulière, le nombre de dents de moulins, elles occupent la plus grande partie de la mâchoire & ont plusieurs racines.

Il faut remarquer icy que les dents de la mâchoire sup. ont plus de racines que les autres, & leurs racines sont courbées en forme de crochets parce qu'elles sont suspendues, & que la mâchoire sup. n'est pas si solide que l'inf.

Il est certain que par la seule structure des dents dans la queue des animaux en queue, il est facile de voir, & de connaître de quels animaux ils se nourrissent, leur par exemple qui vivent des végétaux, comme les lions, ours, sangliers, léopards, tigres, éléphants, chats, chiens &c. ont les dents incisives longues & tranchantes comme de l'épée, les canines, qu'on nomme de dents sous-longues & crochues, leurs molaires sont raillées en forme de fleurs de lis & particulièrement deux lions, les incisives sont tranchantes pour couper la proie, les canines crochues pour la retenir, & les molaires servent à mordre & briser, la mécanique dans la nature des dents est si ingénieuse que l'homme ne peut que la copier & imiter.

Nous regarderons d'abord cette dent comme un levier & nous remarquerons deux choses, la 1^{re} la dent est fort courbée, ce qui fait qu'elle appuie sur plus de parties, la 2^e il en sort une partie en dehors qui sont deux choses qui contribuent extrêmement à la force, & ce qui augmente l'avantage, & que l'aluole est courbée comme l'indien ou on fait dans les mécaniques que plus la distance est grande du point fixe à la puissance, plus la force augmente, ce qui se trouve fort bien icy car nous prendrons pour point fixe l'endroit où passe la dent qui est l'aluole, la puissance en général on le mouvement de la mâchoire, & comme nous avons dit, l'aluole ou point fixe

pour faire un courbe ce qui augmente d'autant plus la force que le
courbe est grande.

Il faut pour rendre la chose plus intelligible et palpable et pour mieux
entendre la force de ces dents, nous les comparerons adit tenaille, pour les
arracher sans peine d'elles que nous faire un instrument qui aye beaucoup
de force pour arracher qu'on nomme tenaille, il faut mettre le clou
pour fixer ce qu'on se l'arrache à bout des tenailles qui doit prendre,
et quand le clou laisse les branches fort longues, et plus ils ont de force que
les tenailles aient de force pour arracher les bords plus ils laissent les
branches longues.

ACADEMIE
CHIMIE
C

la nature est servie de cette même mécanique à l'égard de ses
dents, elle fait qu'il sort très peu de la dent au dehors, en que ce qui est
enfoncé dans l'alvéole a 4 fois plus de longueur que ce qui sort comme nous
avons dit, et est par là que les animaux ont une si grande facilité à
arracher des branches d'arbres comme le sanglier et par ce que en enfonçant
cette courbe leur donne une force invincible, de même que lorsque
nous voulons avoir un clou bien fort, nous enfonçons bien avant
la lame dans le manche, c'est ce que l'expérience journalière démontre,
il faut aussi remarquer que les muscles crotaqueux et masséters,
insèrent et sont fixés d'une telle manière qu'ils se lèvent notablement
en haut fixe, et l'appuy de la mâchoire inférieure, qui dans la cavité
des os des tempes ce qui donne beaucoup plus de force à ces muscles et
par conséquent à la mâchoire par ce que la longueur de l'os sur le haut
duquel est appliquée la force des muscles est fort considérable pour
à cela que ces muscles sont extraordinairement gros dans les animaux
il faut en core remarquer que les dents les plus proches de ce point fixe
sont de beaucoup plus fortes, pour ce que lorsque nous voulons casser
quelque chose de dur nous le prenons avec les dents les plus reculée,
et que plus la mâchoire est courbe plus les dents ^{supérieures} inférieures sont fortes
parce que le point d'appuy entre elles doit faire moins de résistance, une
que l'os levier est plus courbe, et est pour ce que les animaux qui ont les
mâchoires longues ne se servent des dents incisives que pour prendre les
aliments, et n'ont presque point de force, on peut déduire de la force
proportionnée des dents molaires.

Examinons un peu la structure et artificielle merveilleux des mâchoires
des différents animaux et principalement des poissons.

Les mâchoires de ceux qui vivent de poisson comme les brochets et
les autres de petites dents en manière de scie, fréquemment échoués
arrangés de dents mobiles comme nous avons des aîles en bas les
des dents ceux qui vivent des coquillages ont le palais garni de petites



petites minuscules dures, et disposées en long et étroitement, sont régulières
quelques uns avec ~~claire~~ ~~concave~~ un os alarai ne de la langue par de la
même manière, d'autres ont la langue osseuse et de cette structure, les
par le moyen de ce petit trait poly qu'ils forment la logeillage pour être
nourrir.

Les animaux qui ruminent et qui rumachent comme boeufs, brebis et
ont le bout des deux mâchoires tellement disposées que les dents sont
arrondies, et en haut ont un escale de bœuf les mâchoires pour y avoir une rangée
de petites dents plates et courtes et la partie inférieure de leur mâchoire
il y a des grosses dents plates et irrégulières dans les canines, après cela il y a
aux animaux pour les animaux le nourrir, car ils ne vivent que
d'herbe et de graine. Car pour quoy a-tu différence de la mécanique des
mâchoires de ceux qui vivent de paille, ils nous pourrions dire
semblables, et leurs dents sont disposées en pièces qui ne sont bonnes
que pour ruer, arracher, et non pour couper, puis qu'ils n'ont besoin
que d'arracher les herbes qu'ils mettent en gelation qu'ils poussent avec
leur langue dans le fond du palais pour y avoir une chaise bruyante
pour les muscles. Affin de dire tout ce qui concerne cette manière et ne
rien oublier, de tout ce qui regarde les dents, et leur action, disons
quelque chose du bec des oiseaux.

Les oiseaux qui vivent de paille comme le premier ~~le premier~~
l'ongle le corbeau et plusieurs autres ont le bec dur fort crochu et
pointu par le bout pour déchirer, la courbure est cannelée, et les bords
tranchants ce qui fait la facilité avec laquelle ils coupent et déchirent
la chair. Ceux qui ne vivent que de grain ont le bec plus droit que les
autres, et moins pointu comme le de même afin que le grain y soit
concassé pour être cassé plus facilement, les oiseaux sont généralement
tous les petits oiseaux comme moineaux &c.

Ceux qui vivent de l'eau et d'herbe, comme les canards, plongeons, cygnes, et plusieurs
autres ont le bec disposé d'une telle manière qu'il est rond et plat et arrondi
par le bout et n'est pas solide par tout comme celui des autres oiseaux
mais il est fait à l'usage comme la mâchoire des autres animaux
le bec est recouvert d'une membrane qui s'y attache tout autour et qui y est
tellement appliquée qu'elle se cache autour des bords du bec sup. ce qui forme
une espèce de lèvre, d'une membrane qui recouvre la sup. est bandede les
bords du bec tout au long voilà un artifice bien singulier, car leur bec
est disposé de telle manière qu'il peut prendre de l'eau en assez grande
quantité à cause du bec inf. qui est en manière de gondole, et comme
l'eau ne suffit pas pour leur nourriture, les bords du bec sont inégaux
affin de pouvoir pincer plus facilement l'herbe qu'ils prennent, ou
rompre le grain de durs ils doivent le nourrir.

Voilà l'ingénieuse et admirable mécanique pour la nature son

nature sert servie dans la fabrique de la mâchoire et des dents de la plus
par des animaux qui se nourrissent tous d'aliments qui leur sont propres
suivant la différence des positions de les organes, et je diray encore une chose
qui est que le célèbre Mr. Gassendi après avoir bien examiné la structure des
dents de l'homme a conclu qu'il estoit né pour vivre de grain et non de chair
et que c'esté qui la limitation des autres animaux qui la commande de
manger, mais si l'on a bien examiné la structure d'un homme qui se nourrit de chair.

Il y a dans deux mots les usages des dents qui sont fort considérables
qui peuvent être regardés en général et en particulier, l'usage commun
des dents, en dapper à former la parole et pour la beauté, pour empêcher
les aliments de sortir de la bouche, de servir de boucher à la langue et
de défense au sanglier et plusieurs autres, mais le plus noble est de macher
les aliments, car tout de même que l'eau ne peut d'ordinaire se plasser à l'œil
est confus et bien broyé, pareillement notre salive ne peut pas pénétrer
les aliments si ils n'ont été broyés par les dents.

Usage particulier des dents en deux incisives de couper et trancher,
aux canines de lacer et de rompre, et aux molaires de broyer et de mouler.
Faisons une récapitulation des apophyses, canines, fosses, dents, et dents
de la tête.


Les apophyses de la tête sont externes internes, les externes sont de
chaque côté la coronide, l'orbitale de l'occiput, la nasale, la sphenode,
et la zygomaticque des temporaux du sphenode la condyle et la coronide
de la mâchoire inférieure. auxquelles on peut adjoindre la zygomaticque de la
maxillaire, ou pommettes et les canines du coronal ditte, les dents, les
internes sont les pines du coronal, le et l'apophyse de l'ethmoïde, les
canines et allongements du sphenode pour les nerfs optiques, les
prolongements des temporaux et la corne de l'occiput, on pourroit aussi
adjoindre l'autre apophyse osseuse que l'ethmoïde se trouve dans l'os.

Dans toute la tête on ne trouve qu'une seule cavité proprement dite,
située aux temporaux pour la articulation de la mâchoire inférieure.

Les fosses sont externes ou internes, les externes sont les orbites, les
nares, le palais deux à l'os de la mâchoire inférieure, un à chaque os, les
2 parigoides les zygomaticques que quelques uns adjoignent aussi bien que
les enfoncements du coronal au dessus des dents, les internes sont deux
au coronal pour les lobes antérieurs du cerveau deux aux temporaux,
et 4 à l'occiput dans la sup. pour les lobes postérieurs du cerveau
deux inf. pour le cervelet on y pourroit aussi adjoindre les deux vestiges
des dents dans les os bien que la tête du sphenode.

Les pines sont deux au coronal deux au sphenode, les autres ne
se trouvent pas dans tous les os, et les deux maxillaires, quelques
uns y adjoignent encore deux de l'apophyse maxillaire qui est creusée
les dents.



[illegible]

2
avons remarqué que le crâne d'un homme étoit composé de deux tables osseuses
dont l'intérieure étoit spongieuse, & que les deux tables, dans la plus grande
partie de la paît d'un crâne, dans l'éléphant étoient de même nature. La
longueur du crâne de dix à sept pouces de largeur, cependant les deux tables sont for-
mées de onze chacune quinze lignes de largeur l'intérieure de celles est plus
épaisse & fait plus de trois quarts de la paît d'un crâne. Ce la n'est égard à la
pour prouver en chasser plus facilement les ossements de cet animal les ossements
sont bien remarqué quelques auteurs qui ont dit que l'éléphant pourroit bien
recevoir quelque coup de flèche dans la substance du crâne sans lui causer
la mort ny même de douleur à cause de son épaisseur ny même reprendre
des ossements un animal ne a aucune suture & son crâne qui est si épais par tout
comme nous venons de remarquer n'a pas une suture même d'une ligne
de largeur derrière à l'endroit qui répond au cercle, c'est ce que l'on a
fort bien les gens qui les gouvernent, car quand cet animal lui est en folie
ce qui lui est fort ordinaire & lui arrive fort souvent, ils ont beau lui de-
poser à son débiter, & à son gavage, & si nous n'avons l'industrie de lui donner
quelque coup, en un endroit ou de lui faire quelque clou ou autre chose semblable,
ils le devroient, mais par le moyen de cet artifice ils s'en tiennent à l'œuvre
de la force de cet animal & le tiennent sur le champ.

Puisque nous en sommes à l'éléphant, il ne seroit pas mauvais de dire
deux mots de la paît de la trompe dont la structure est tout à fait semblable
à celle de notre langue, qui est une fibre qui se trouve en effet
elle a tout sorte de fibres de même que notre langue par le moyen desquels
elle fait tous les mouvements différents, & se replie en mille manières
suivant le besoin, les fibres ont la même structure, la même
disposition, & l'arrangement que celle de notre langue, cette trompe est
faite de deux tuyaux par lesquels il respire comme nous avons vu par nos
deux narines, mais ce qui est de plus singulier & de plus remarquable, c'est
qu'il sert presque avec la même adresse & pour les mêmes usages
que nous nous servons de nos mains. Car veut-il manger, il prend l'aliment
avec la base & l'extrémité de la trompe, puis la replie dans sa bouche
il y porte ce qu'il a pris, quand il veut boire il se sert de la même mécanique
car il s'en sert avec la trompe la même d'unseau d'eau, & la relève dans
ensuite dans sa bouche, & y verse tout ce qu'il a pris, de la même
manière qu'il s'en sert pour verser l'eau, en un mot elle a presque
autant de adresse & de dextérité que nos mains. On en a vu à
verser de l'eau des cordes d'un homme & l'on ne peut pas en pas
de l'eau avec les mains, & prendre à terre une petite drachme d'huile
et la porter à la bouche. prendre un verre d'un d'eau & la verser dans
la trompe pour la lui verser, & faire plusieurs autres choses fort
industrielles, & si la trompe est de même par le moyen d'un petit rebord qui se
trouve à l'extrémité de la trompe, & une petite arête, semblable à un
petit doigt si elle est à l'opposé du rebord & dont il se sert comme nos
deux doigts, venons à présent aux différences de la trompe de quelques
animaux. Homme

ACADEMIE ROYALE
CHIRURGIE
N


l'homme a la tête fort grosse a comparaison de certains animaux qui sont effrayablement grosse comme l'éléphant. Le loup, le chien, les autres, quand on les coupe la capacité du crâne destinée pour contenir le cerveau, en quatre fois plus grand dans l'homme que dans les animaux dans la grosseur de la tête. Cependant, dans l'éléphant par exemple de l'épaisseur de la crâne et dans les lions et autres animaux carnassiers de l'épaisseur de la queue, les muscles intrinsèques, et massiers qui sont d'une épaisseur prodigieuse, que des poils dans leur peau est hérissée, et enfin d'un gros crâne ou épine qui se rencontre au sommet de la tête du lion le long de la suture sagittale, et un autre très considérable le long de la lumbale de leurs os par lesquels sont fort aplatis et enfoncés pour loger les muscles intrinsèques, mais en compensation comme ils ont moins de cerveau que l'homme, ils ont beaucoup plus de moelle épinière que lui, à cause qu'ils naissent plus près de la tête, et nous besoin que de beaucoup de force pour vaincre et combattre les animaux dont ils doivent se nourrir.

En un mot de tous les animaux que j'ai observés, le seul singe considéré une certaine espèce de singe. Car il faut savoir qu'il y en a de plusieurs espèces et qui sont en plus grand nombre que celles des chiens, ce singe, dit-on, a la tête la plus semblable à celle de l'homme, il a la capacité la plus grande de tous les animaux, après l'homme, il a la rose rouge comme celle de l'homme. Les os de la mâchoire et de la mâchoire inférieure qui sont pointus dans les autres animaux, but arrondis comme ceux de l'homme, il a un conduit osseux dans le temporal pour la cavité de l'oreille de même que l'homme, ce qui se rencontre aussi dans le lion les sinus latéraux de la dure-mère se déchargent en lui aussi bien que l'homme dans la jugulaire interne, et dans les autres animaux ils se déchargent dans la veine par un conduit osseux. Mais au dessus du conduit de l'oreille dormant que l'homme et le singe ont la jugulaire interne plus grosse que l'externe, et les autres animaux sont au contraire au contraire plus grosse que l'externe, tous les organes de l'oreille du singe sont semblables à ceux de l'homme, enfin la tête de ce singe est si semblable et conforme à celle de l'homme qu'il y a peu de gens qui ne la prennent pour la tête d'un homme humain, et toute la plus grande différence qu'il y a est que son apophyse mastoïde est fort petite et ne semble qu'un point à l'extérieur, quant à l'intérieur la structure est tout à fait semblable à celle de l'homme.

Les os de la mâchoire ou maxillaire de l'éléphant sont une fort grande avancée en avant pour enfoncer la défense de cet animal, et les animaux carnassiers sont enfoncés aussi bien que l'angle de la mâchoire inférieure pour placer et loger plus commodément les massiers.

La mâchoire supérieure des animaux carnassiers est articulée par un ligament pour les raisons que nous avons déjà dites et que nous ne reprenons pas ici.

les animaux carnassiers ont six dents incisives à chaque mâchoire
et quatre canines, c. plusieurs molaires taillées en pointe de diamant
en forme de fleurs de lys et entrent toutes les unes entre les autres comme
nous dirons.



les animaux qui ruminent n'ont point de dents incisives ni de canines
à la mâchoire supérieure à l'exception du dromadaire et du chameau
qui ont quatre canines, mais point d'incisives, ces mêmes animaux n'ont
pas non plus de canines à l'inférieure à l'exception du dromadaire et du
chameau qui en ont deux à six incisives et plusieurs molaires, à l'une
et à l'autre mâchoire, ils ont les mâchoires fort longues douces et qui
ont peu de force aux dents incisives, l'inférieure est faite de deux pièces jointes
par une charnière affaiblie comme ces animaux sont construits de traverser
la mâchoire contre terre pour paître ils sont fort sujets à se blesser
à braver la mâchoire supérieure contre de pierres, cette charnière
amortit la violence du coup, et c'est ce que ces os ne se rompent
si facilement ainsi que nous avons prouvé et de montrer plus haut,
la mâchoire est articulée par arthrodie pour leur donner la liberté
de la manœuvre de ruminer, pour ruminer et brayer les herbes.

les animaux qui vivent d'herbes mais qui ne ruminent pas comme les
chevaux ont six incisives, deux canines, et plusieurs molaires à chaque
mâchoire, et l'inférieure est articulée par arthrodie.

Je ne repasserai pas ici les différences des os des animaux, nous en
avons parlé dans son lieu.

passons à la deuxième partie du squelette que nous avons nommé le
tronc, par ce mot de tronc on entend cet assemblage mercuriel de
différents os qui s'étend depuis la tête jusqu'à l'occiput, en qu'on divise
ordinairement en trois parties, le cou, le tronc, et les os
membres nous allons examiner toutes ces parties en particulier, et
toutes les différentes pièces qui les composent, pour bien comprendre
sa structure et les usages, et pour cela nous commençons par les os
parties de ce tronc qui est ditte épine.

On doit considérer l'épine du dos comme une colonne qui est le
soutien, et principal appui de la tête et des autres parties supérieures
comme une colonne dorée, faite avec tout l'artifice dont la nature
est capable, et d'une figure semblable à une pyramide.
cette colonne est composée de plusieurs pièces pour obéir aux
mouvements du corps et les rendre plus faciles et pour les autres raisons
que nous avons apportées en expliquant pourquoi le corps des animaux
est fait de plusieurs pièces.

Ces pièces sont des os solides sont appelées vertèbres dans les

deux des plus considérables et les plus massives forment la base de cette colonne qui doit être large pour le soutien de tout le reste, et celles qui suivent perdent insensiblement de leur volume pour former vers le

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

de la pointe de cette pyramide.

Cette chaîne de vertèbres a deux articulations comme nous avons dit avec la base, la première est ginglimoïde de la 2^e espèce et se fait avec la première vertèbre, la 2^e se fait avec la 2^e vertèbre par le moyen de son apophyse édenroide

Je remarque en fait deux parties dans les vertèbres, savoir les corps et les apophyses.

Le corps ou base n'est qu'une masse osseuse égale en étendue et en largeur à son extrémité pour la fermeté et commodité de leur situation les uns sur les autres.

C'est ce qui fait la partie la plus large, ample, grosse, et insérée de l'épine dont les deux surfaces sont de deux lames de bois fort dures, et le milieu, ou le centre est fort spongieux et poreux pour plus grand légèreté, dures et de la coupe est de la même nature d'une membrane dure et forte qui n'est apparemment qu'une production ou enlacement de ligaments qui les lient.

Les apophyses font la partie postérieure et robuste de cette pyramide et sont ordinairement au nombre de sept à chaque vertèbre, savoir quatre obliques dont deux sont dites ascendantes et deux descendantes, deux transverses, et une droite dite épineuse, laquelle a donné le nom d'épine à toute cette colonne.

Intervalle qui se trouve entre le corps et les apophyses est un long canal qui rend de la même position des vertèbres les uns sur les autres, de sorte que le grand trou qu'elles ont chacune se trouve immédiatement au milieu, et semble se continuer par les moyens jusqu'à la fin.

Ce canal renferme et défend la moelle de l'épine, doucement que quelques animaux sont plus amples, et d'un calibre bien plus gros que l'homme, parce qu'ils ont la moelle épinière bien plus grosse que l'homme, le canal ne perd point de son volume, restant si large en son commencement, ou les vertèbres sont beaucoup plus petites qu'à la fin, moelles sont beaucoup plus grosses.



Outre ce canal très large et très sensible, il y a des trous au corps de cette colonne qui répondent dans le canal et donnent issue et entrée aux vaisseaux des nerfs et aux vaisseaux sanguins pour la nourriture de la moelle, ces trous sont faits de la rencontre de échancrures des vertèbres, de sorte que l'échancrure de la partie supérieure de la vertèbre supérieure, et celle de la partie inférieure de la vertèbre inférieure, font un trou et ainsi des autres.

Les vertèbres ont double articulation entre elles, une qui leur

2

apophyses et la partie grave de leur Corps.

l'articulation qui se fait par le moyen des apophyses est une double articulation, qu'on doit rapporter à la 1^{re} espèce de ginglyme, mais on me dira que nous avons dit que l'articulation qui se fait par ginglymes n'a de mouvements que de flexion et d'extension, et que cependant outre les mouvements le spine peut tourner, ce qui vient, comme nous avons dit de ce que les vertèbres les unes sont plates et superficielles et que l'articulation est lâche. Comme on remarque aussi en l'articulation du tibia avec le fémur, ainsi quoique les principaux mouvements soient la flexion et l'extension, elle ne reste pas de tourner de un peu à droite et gauche sur les costes.

L'articulation qui se fait par le moyen de leurs Corps est, l'endroite, c'est à dire par le moyen d'un gros cartilage qui occupe l'entre deux des vertèbres les lie, unit, et joint ensemble, de manière pourtant qu'ils cedent un peu pour les mouvements differents et necessaires de le spine, et il sert outre ça comme de mortier ou de laine de plomb pour rendre le mouvement bien plus aisé, plus prompt, et pour empêcher que les vertèbres ne frottent, et ne se froient continuellement ce qui rendroit les mouvements aigus et difficiles.

Il n'y a qu'un cartilage à chaque entre deux des vertèbres, à la difference des autres articulations avec mouvements, et cela à deux raisons, car en effet s'il y eust en deux cartilages ils auroient peu facilement se separer les uns des autres et ainsi ils auroient puient rendre l'office qu'ils doivent rendre à le spine qui est de le rendre ferme.

Outre les cartilages il y a de forts ligaments qui affermissent cette articulation et qui prennent leur origine du Corps de la vertèbre supérieure et s'insèrent au Corps de la vertèbre inférieure et ainsi successivement.

Mouvement de tout le spine en general est fort sensible et considerable quoique celui de chaque vertèbre en particulier soit tres petit et le mouvement se fait d'autant plus grand que les cartilages sont epais, et les apophyses epineuses, et les ligaments éloignés les uns des autres. Comme nous dirons dans la suite toute cette colonne est la figure d'une double S. romaine, car au col elle se courbe en dedans, au dos en dehors, au lombes de dedans en dedans, le sacrum en dehors, et enfin le coccyx en dedans.

Après avoir parlé en general de le spine des vertèbres et des parties qui les composent il faut en parler en particulier. Le spine se divise en cinq parties savoir le col, le dos, le lombes, et le sacrum et le coccyx, examinons à present le col, c'est à dire le col, de particulier. Mais nous verrons que chacune de ces pieces a des parties à remarquer.

Le col a sept vertèbres qui ont chacune de particulier, quatre se trouvent au dedans pour servir la gorge, l'œsophage et plusieurs nerfs et autres vaisseaux.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
O. M. L.

que leurs corps ont beaucoup plus petit et moindre, et dans la partie inférieure
s'adoucissant et s'arrondissant en bas dans la vertèbre, se trouve une cavité dans la
partie supérieure de son corps, ou son allongement s'arrête, ainsi s'arrête même
aussi les uns des autres, et pour chies aussi bien que les transverse pour
conservation de plusieurs muscles, les transverse ouvre cela pour
trouver pour faire un canal pour les veines et artères vertébrales, voyons
maintenant quelle est chacune de ces pièces de particulier.

La première vertèbre du col dire atlas. a une quelle pierre l'apophyse, d'ala
de particulier quelle a toutes les apophyses obliques et les autres. Elle
glenoïde, ainsi elle reçoit des autres parties, et reçoit aussi une partie
naïve de l'épine pour une petite éminence à la place qui est pour la
fourchette, et elle a un point d'apophyse épineuse pour ne point nuire d'être
d'un petit muscle qui va de la deuxième vertèbre à l'occipital quelle a
pour de corps quelle a une sinuosité en dedans du grand trou, en la partie
extérieure, on en reçoit la deuxième, et elle a encore de particulier
une échancrure ou passage pour la deuxième vertèbre de la deuxième partie du corps.
La deuxième vertèbre du col a de particulier une apophyse qui, sur le
corps et dans la sinuosité de la première, cette apophyse est dite a une
de sa ressemblance avec une dent en forme d'ovale, ou d'ovale par le moyen
de laquelle la tête et la deuxième vertèbre ne forment qu'un corps, voilà ce sont
leurs mouvements obliques et d'un mouvement circulaire, on la nomme pour mal
apophyse de la tête comme sur elle comme une voie sur un muscle.

Mais on me demandera comment sont communs ils se font que dans le
mouvement de la tête sur la deuxième vertèbre, ce pivot ou dent ne
point de la cavité, à quoi la nature a pourvu par le moyen d'un ligament
transversal qui va d'un côté de la deuxième vertèbre à l'autre, et ne laisse qu'un
petit trou qui permet seulement à ce pivot de passer et de tourner, mais
savoir que dans les mouvements violents, ou dans une flexion du col fort
grande, le ligament ne vient à presser, et la dent par conséquent à comprimer
la moelle, ce qui causeroit infailliblement la mort subite de l'animal, elle a
même le presser par un muscle, de deux autres ligaments, un qui tend entre
et l'arche de la deuxième vertèbre, l'autre l'attache à l'occipital et ces deux ligaments
permettent pour à cette dent de s'élever de la cavité à quoi servent
encore deux ligaments qui attachent la deuxième à la 2^e vertèbre, l'un par devant
l'autre par derrière.

On me demandera encore comment la moelle n'est point comprimée dans
les mouvements de l'épine, et principalement dans les obliques, la nature
si toujours admirable dans les opérations s'est servie ici d'une mécanique
si ingénieuse, car elle a fait le trou de la moelle plus gros que le volume



de la moelle qui par conséquent ne sauroit point le calibre de la moelle,
et ce qui est entre deux est occupé par des membranes souples, par où vous
voyez, ainsi que ces vertèbres autour la liberté de se mouvoir un peu en tous sens
sans gêner la moelle, mais crainte que dans de grands mouvements les

CHIRURGIE
vertèbres ne venant à puster le point d'ouverture, et ainsi à blesser la moelle
par une suite de forts ligaments, comme nous avons dit, qui permettent
aux vertèbres de se mouvoir en tous sens, mais seulement que jusqu'à
un certain point, après lequel les cartilages et les apophyses qui ne permettent
aux vertèbres de descendre fléchir, ou tourner que jusqu'à ce point, et elles
pourroient gêner la moelle.

On demandera la solution d'une 3^e difficulté. Sçavoir comment la 1^{re}
vertèbre et la dixième paire de nerfs du cerveau qui se couronnent sur la
1^{re} vertèbre et se joignent entre elle et l'occiput, comment, dit-on, les vaisseaux ne
seront point gênés par la 1^{re} vertèbre dans les mouvements, voyez comment cela
se fait, nous avons remarqué dans la 1^{re} vertèbre une échancrure ou
cavité, les vaisseaux, et ainsi les nerfs, le tubercule de la 1^{re} vertèbre, mais à son
dessus, la nature a tellement disposé les choses que dans tous les mouvements
de la 1^{re} vertèbre elle a toujours en cet endroit une ouverture, et un conduit —
considérable pour les vaisseaux. Car elle a une dernière occiput une petite
éminence, laquelle dans l'extension de la tête pose sur la 1^{re} vertèbre et ainsi
lui permet pas de se retourner en arrière et la 1^{re} vertèbre
a comme nous avons dit une éminence à la petite dépression qui aide à cela,
ce qui sert aussi à conserver la moelle, par devant nous avons le muco-
que nous permet pas de fléchir la tête que jusqu'à un certain point,
et ainsi la tête a une espace entre elle, et la 1^{re} vertèbre.

pour ce qui est des nerfs qui sortent de la moelle, la nature les a fait un
petit nombre en haut, et les a fait dans une capsule cartilagineuse traînée par
dessus, et les nerfs d'en bas des nerfs qui pourroient se blesser des mouvements
de la tête.

Toutes les autres vertèbres du col ont rien de particulier sinon que leurs apophyses
obliques ascendantes sont rondes et les descendantes creuses à l'exception de la dernière
qui les a toutes rondes.

Les 12^{es} du dos se voient en dehors pour placer plusieurs muscles, et pour rendre
la cavité de la poitrine plus ample, toutes les 12^{es} ont de particulier que leurs
corps en plus gros que celui de celles du col et moindre que celui des lombes, elles ont
leurs apophyses droites couchées l'une sur l'autre, et les cartilages qui sont entre
leurs corps sont petits pour que les mouvements ne soient pas gênés et petits,
leurs apophyses obliques ascendantes sont creuses, et les descendantes sont rondes, elles
ont une cavité de chaque côté à leurs corps qui reçoit la tête de la tête et un
autre à leurs apophyses, mais toutes qui reçoivent l'éminence de la tête pour la soutenir
qui de cette manière est une double articulation. qu'on doit rapporter à la 3^e espèce

de vingtaine.

24

ROYALE
CHIRURGIE
N

Il y a 12 anneaux plus en dehors que les autres, le 2^e est le cartilagineux, —
aussi quelle est la hauteur de l'arc. Les autres jusqu'à la 11^e sont dits osseux,
mal à propos, puisqu'ils sont joints avec les côtes, la 12^e est l'anneau
qui se perd dans la luxation qui cause le vomissement continu la 12^e est dite
oblique, ronde, ainsi elle est vue de tous côtés, elle a toutes les propriétés
de l'arc du col qui reçoit et ne reçoit pas de charge, les anneaux de charge ont les
apophyses épineuses des vertèbres du dos fort hautes, droites, longues, et larges, et
qu'une courbure par leur base les rend plus fortes, car la leur est si maniable
qu'il y soit attachés en est plus long et le leur de résistance en est plus faible
augmenté, ainsi que cela enjoint qu'elle ne puisse pas résister si facilement
les lombes ont 5 vertèbres qui ont leurs corps bien plus amples et élargis
que toutes les autres, les cartilages plus gros et plus épais, leurs épines longues,
plates, droites, et fort éloignées les unes des autres, leurs apophyses transverses,
longues et plates comme de petites côtes pour la sûreté et assise des viscères et
pour loger plusieurs muscles, enfin elles ont leurs apophyses obliques ascendantes
craissent les descendantes rondes
articulation des vertèbres des lombes, est bien disposée quelle rend les lombes
capables de tous sorts de mouvements qui vient de la distance de l'apophyse
épineuse, et de la grandeur des cartilages surtout le mouvement de l'épine
depend de la distance plus ou moins grande que les apophyses épineuses sont plus
ou moins éloignées les unes des autres, et les cartilages plus ou moins épais en
effet par rapport au l'épine à beaucoup de mouvement les vertèbres ont leur
épine droite et leurs cartilages gros comme on voit dans le col de la lombes,
et les vertèbres sont fort courbées, à mouvement en fort petit comme au dos,
et laque nous envoie plus ce que nous venons de dire est écarté, ou lequel
comme vous savez, se met en rond comme une balle, on remarque aussi
que toute son épine est faite de deux très fort séparées les unes des autres
plus de gros et épais cartilages, et les apophyses, moins des autres droites, et
travaillent entre elles de grands espaces, et manient le mouvement de l'épine
se fait quant à ces cartilages et les apophyses voisines, pressent.
Il n'y a rien de si merveilleux que tous les jours que font les dans eux, et
l'épine tout cela, ainsi de la mécanique des vertèbres, et quant à l'épine
de celle des lombes dont l'articulation est la même, à l'épine comme à l'épine
comme nous venons de dire, les dans eux plus leur corps, en mille manières
différentes manières et l'on a vu de gens qui naissent avec l'épine de
leurs lombes, mais encore une fois elle depend du lieu des vertèbres des
lombes que les dans eux plus et moins en diverses manières, et la même
encore qu'elle peuvent favoriser toutes sortes de mouvements, enfin l'épine
par conséquent que les vertèbres des lombes demeurent disposées en une de la
même manière qu'elle sont dans les autres hommes, il semble que leur




ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

Leurs apophyses épineuses seroient un grand obstacle, principalement quand ils se remuent, & violent leurs corps en arrière, elles s'arrèsteroient sans doute les unes les autres, ce il faut bien que pendant que ces os en sont encore tendres les apophyses se sont élevées par ces différents mouvements, & par ceux que ces dans eux ont faits en leur jeunesse ou que leurs mouvements ont fait faire en les prenant étant encore enfans & les plaçant sur leurs genoux lepine de tous les manieres, domme que la dans un an cet os qu'on ne voit point à tous s'en est commanché de son enfance, & n'a bien de la pousseur, & n'est pas arrivé un moindre changement & altération aux autres parties des vertebres, & bien que ce n'est pas sans quelque raison qu'on dit communement que les gens ont les reins rompus, les sacrum ainsi dit cause qui soutient les parties de la generation dites sacrées, ou qu'il en soit grand, & au lieu que n'est que de la cartilage de la base de quatre ou cinq pièces immobiles jointes ensemble par l'abondance, de maniere que les os qu'un seul os, dans les adultes les os est d'une substance fort epaisse & solide, gibbe en dehors & en dedans pour faire la cavité de la base, & est os est percé par des trous voisins aux parties antérieures & postérieures, selon les vertebres, pour ne point empêcher son articulation avec les os des côtes. Les trous sont quatre antérieurs & quatre postérieurs c'est à dire quatre trous de devant & quatre des derrière, car il y a deux rangées & quatre trous à chaque rang, les sacrum n'est point rempli de moëlle mais de nerfs qui sortent par quatre paquets, quatre par les quatre trous postérieurs, la 5^e par une fente qui est vers l'assemblage du lumbaire, & la 6^e par un trou impair au milieu de lui, & qui regard au grand trou des vertebres, les quatre trous antérieurs sont bouchés de membranes, & il n'en sort point de nerfs comme nous ont dit les anciens, ils sont beaucoup plus gros que les autres, & on ne sçait pas qui ils aient de service usages que de rendre les plus légers, les os a en la partie sup^{re} deux apophyses une de chaque côté, & qui ont chacune deux cavités & une éminence pour recevoir les deux éminences & la cavité des os innominés, & faire un joint de la 5^e espèce, outre cela on remarque en la partie postérieure quelques éminences sous les unes sous les autres, & sous d'autres les apophyses obliques, & quelques autres moyennes entre les deux rangs de trous lesquels on nomme pour le sçavoir apophyses épineuses. cet os ayde à former la cavité de l'hypogastre d'une le bassin, à soutenir l'intestin rectum la matrice aux femmes & la vessie dans les deux sexes &c.

Le bout & extrémité de los sacrum est suspendu le lumbaire ou lumbion, ainsi dit cause qu'il ressemble au bec d'un corneau, il est fait de plusieurs pièces dans les enfans, & d'une seule dans les adultes, ce lumbion se joint en dedans pour soutenir le rectum, & sert adonner origine aux tendons de l'anus, les anciens luy ont donné l'usage de boucher le grand canal de lepine, mais cela est faux puis que ce canal ne descend

descend pas si bas que le crouignon, comme on le peut voir, il y a des auteurs
qui rapportent qu'il y a des pays où les hommes ont le cou allongé, et
forment une manière de queue. Le petit os peut bien se reculer en arrière
dans l'allongement pour faire le passage plus grand et plus libre.



La poitrine est composée du sternum et des côtes.

Le sternum est cartilagineux qui fait la partie antérieure de la poitrine.
est fait de plusieurs pièces cartilagineuses dans les enfants, et dans les
les vieux l'os est pour l'ordinaire de deux osseuses, mais fort poreuses et
spongieuses jointes ensemble par du ligament. La 1^{re} pièce est la plus petite
et est située au haut de la poitrine, on y remarque quelques éminences
pour l'origine de quelques muscles comme le sternocléidomastoïdien et une
autre cavité ou fosse au milieu pour loger, et laisser passer la trachée
artère, on y observe aussi quatre trous deux de chaque côté dont le
supérieur reçoit la clavicule et l'inférieur la 1^{re} côte, le 2^e et le 3^e
les côtes fausses, pour recevoir les six dernières côtes vraies, et les
cartilages à son extrémité qu'on nomme des fosses qui s'y attachent,
on y remarque le cartilage dit xiphoidé ou d'égale forme avait on
de la figure, le sternum a une figure pyramidale dont la base est en bas
et la pointe en haut, cet os sert à former la cavité de la poitrine et
à défendre le cœur, et les poumons comme un bouclier, à l'articulation
des côtes par devant, et enfin à attacher le médiastin. et donner origine
à l'artere au muscle triangulaire.

Les côtes sont deux de chaque côté de figure semblable à celle d'une
anne de pot, dites côtes vraies qu'elles forment les côtes de la poitrine, on
les divise en vraies et en fausses, les vraies sont sept de chaque côté, ainsi
dites vraies qu'elles se joignent par devant au sternum par le moyen des petits
cartilages obliques qu'elles ont, les fausses ainsi nommées parce qu'elles ne
ont point de jointure au sternum, comme les vraies, et que tous leurs cartilages
s'attachent et se joignent les uns aux autres, dont l'extrémité des premières
s'attachent à l'extrémité du sternum, les fausses sont cinq de chaque
côté, toutes les côtes sont articulées ensemble immédiatement comme les
vraies, et médiatement comme les fausses avec le sternum par du cartilage
et par derrière avec les vertèbres du dos par vingt une de la 2^e espèce.

Chaque côte en particulier est divisée en deux extrémités une antérieure
et l'autre postérieure, et au milieu dit le corps de la côte.
L'extrémité antérieure qui regarde le sternum finit en cartilages fort
obliques, ainsi qu'une anse de pot, ce qui favorise beaucoup la respiration.
L'extrémité postérieure qui regarde le dos est osseuse, dure et solide
et inégale pour son articulation avec les vertèbres, et pour donner
origine et insertion à quelques muscles, et aux ligaments qui affermissent

leur articulation on remarque en cette partie deux eminences osseuses, dont une qui est le bout de la coste est reçue dans la cavité gravée dans le corps même de la vertèbre, l'autre éminence est reçue dans la pophite transverse.

Le corps des costes est encore divisé en deux extrémités, une supérieure et l'autre inférieure qui prennent le nom des costes d'après le lieu qui relient le nom de corps.

Il y a rien à remarquer en la terminaison supérieure, ce qui regarde la tête, mais en l'inférieure qui regarde l'abdomen on remarque une différence par où passe l'artère, la veine, et le nerf intercostal, on dit de ces costes qu'ils ont deux extrémités et deux corps des costes en leurs inférieures qui regardent la poitrine, et en leur supérieure qui regarde le dos, ces deux parties sont connues et insérées aux muscles intercostaux qui remplissent les intervalles des costes.

Le bout de la coste est rond vers le pôle et plus à mesure qu'il s'approche du sternum.


Le usage des costes est de former cette voûte osseuse, dite poitrine pour couvrir et défendre les parties vitales en pour la respiration, pour nous parler en examinant la structure des poulmon, nous nous contenterons de dire ici que la mécanique de l'insertion des costes consiste en ce que pour l'expiration, elles sont situées obliquement faisant un angle aigu avec l'apophyse, et que pour l'inspiration elles font un angle plus obtus, ainsi quand les costes forment des angles plus droits elles se rapprochent de la poitrine, mais il faut remarquer que cette mécanique n'a lieu que dans les jeunes animaux dans lesquels la poitrine a une mobilité manifeste, ce qui ne se remarque point dans les vieux, dans lesquels le mouvement de la poitrine est si obscur qu'il semble que la dilatation et le retraitement ne se fait que par le moyen du diaphragme, et on remarque cela aisément dans le squelette des jeunes animaux où les costes sont situés plus obliquement, au lieu que dans les vieux ils sont presque droits, ajoutés que dans les premiers ils sont comme cartilagineux et dans les derniers osseux, et inflexibles et par conséquent incapables de mouvement, Remarquez que l'homme a la poitrine beaucoup plus large qu'aucun animal et que les animaux de course ont en revanche leurs costes beaucoup plus obliques et plus courbés et couchés les uns sur les autres, ce qui leur donne une très grande facilité à dilater leur poitrine, et à faire de grandes respirations.

La troisième partie du tronc est dite les os innominés, à qui il a plu aux anciens de ne point donner de nom, je ne sçay pourquoi, ces os forment toute la cavité de l'hypogastre qu'on nomme bassin articulés avec les sacrum comme nous avons dit par la ressemblance de ginglime.

On dit encore ordinairement ces os ont trois de chaque côté mais dans les adultes

adultes, il n'y en a qu'un seul de chaque côté, car les trois pièces qu'on trouve dans les enfants se sont unies par des cartilages, de telle manière qu'il n'y parait plus aucune marque de séparation et on ne voit alors voir qu'il n'ont jamais été distincts.

26



La 1^{re} est la plus grande de ces pièces qui s'articule avec le sacrum en ditte à cause quelle forme les isles, et que le boyau ilium repose dessus, cet os aide à former la parrie latérale et supérieure du bassin, il s'élève peu l'ant en dehors pour loger les trois muscles fessiers, il a un rebord de l'antérieur le postérieur, en sa parrie supérieure il a un rebord de l'antérieur recouvert de cartilages ou s'attachant presque sous les muscles de l'abdomen, en sa parrie inférieure il a une fissure ou passe le tendon des obliques, cet os aide à former la cavité de l'ischium, et le trou analaire, il a encore une éminence qu'on nomme crête ou dent éminence, et une cavité ou niche pour s'articuler avec le sacrum, laquelle articulation est favorisée et affermie par un gros et fort ligament.

La 2^e pièce est ditte ischium et occupe le milieu des trois, l'os fait la plus grande parrie du trou analaire, et de la cavité qui vient à nom d'ischium pour le s'ier.

Enfin la 3^e pièce des os innominés s'appelle pubis, à cause que ^{encore} cet endroit que l'on commence à paraitre les premières marques de puberté, ou de virilité, l'os a une éminence en sa parrie supérieure pour donner origine ou insertion au muscle droit de l'abdomen, l'os aide à former le trou analaire, et la cavité de l'ischium, en fin il se joint à un semblable par un fort et grand cartilage.

On me demandera sans doute si ces os pubis ne se cassent point, et si leurs cartilages ne se détachent point dans les accouchements, j'assure qu'il n'y a point de faire cet os d'un dementy à beaucoup de grands hommes qui prétendent l'avoir observé dans des accouchements difficiles, mais de dire qu'ordinairement, cela arrive, c'est tomber dans une erreur unique, disons donc que cela peut arriver dans des accouchements fort difficiles, mais que cela est fort rare.

La cavité ou bourse de l'ischium sert à l'articulation du fœtus avec les os innominés, pour ce qui est du trou analaire, on dit communément qu'il est fait pour la légèreté de l'os, et pour qu'il y ait une ouverture pour qu'il y ait d'autres usages.

Examinons ^{de pres} un peu enpres les différences qui se trouvent, entre le trou analaire des animaux et celui de l'homme, et pour cela examinons

le sternum, ou ils ont un mouvement assez sensible, et avec l'omoplate par l'acromion, les hommes ont les clavicules plus courbées que les femmes à qui fait qu'elles ont la gorge plus plainne.

ACADEMIE ROYALE
DE CHIRURGIE

usage de clavicules en assurant les omoplates avec la poitrine, à empêcher qu'elles ne tombe sur les côtes, et que le bras ne vienne trop avant, en empêchant la luxation de l'humérus en devant on pourroit aussi dire qu'assurant le bras elles contribuent à son adresse, d'ailleurs que les animaux qui sont pourvus de clavicules, ne sont pourvus non plus d'acromion, et ne se servent des pieds de devant que pour marcher, mais au contraire ceux qui en ont comme chass, singes, chiens, et plusieurs autres se servent nécessairement pour arrêter chose que pour marcher comme voit le monde par.

les omoplates sont des os larges et minces situés un de chaque côté en la partie postérieure de la poitrine couchés sur les côtes depuis la 2^e jusqu'à la 6^e vertèbre ils ont la figure triangulaire dont la face interne est concave pour mieux appliquer sur les côtes qui sont bombées, l'extérieure est fort irrégulière, concave en certains endroits convexe en d'autres, on y remarque une éminence qui se traverse selon la longueur, laquelle on nomme épine, on y remarque aussi deux cavités ou enfoncements une au dessus de cette épine dite pour le sus-épineuse, et l'autre au dessous dite cavité sous-épineuse, la partie supérieure de l'omoplate laquelle côte supérieure et l'inférieure est aussi dite ~~la~~ côte supérieure et la partie postérieure laquelle base et les deux extrémités angles supérieur et inférieur, en sa partie antérieure, il faut remarquer trois apophyses, la 1^{re} qui est la dernière de l'épine appelée acromion, la 2^e est nommée coracoïde à raison de la figure qui ressemble au bec d'un corbeau, la 3^e qui est la plus grosse est dite le col, lequel se termine par une cavité triangulaire pour l'articulation de l'humérus, tous les bords de l'omoplate sont dentés en leur surface interne, externe, et moyenne, entre lesquelles il y a deux sinuosités qui donnent passage à plusieurs vaisseaux et les tendons donnent origine et insertion à plusieurs muscles, enfin il y a à l'omoplate cinq épiphyses, la 1^{re} à l'extrémité de l'acromion, la 2^e à la coracoïde la 3^e au col, et les 2 autres aux angles.

son articulation avec l'humérus est au genou, et avec la clavicule par l'acromion, son usage est de donner origine et insertion à plusieurs muscles et pour l'articulation de l'humérus. elle sert encore à rendre le mouvement du bras plus ample, plus facile, et plus libre, en obéissant à tous les mouvements qu'il est obligé de faire,



donneraient que quand on plie le bras en dedans, elle éloigne la base des côtes
en tirant un peu vers le côté, quand on l'étend en derrière, elle se relève
vers l'épine en s'éloignant un peu des côtes, quand on lève le bras en haut,
on remarque que la base s'éloigne beaucoup de l'épine et s'approche vers
le côté, et en fin quand nous rabattons le bras nous voyons quelle se
revenue et se remet en son état naturel.

La main se généralement prise, ou l'extrémité supérieure se divise en
bras, avant bras et en main proprement dite on peut considérer en
général toute cette extrémité comme un arbre où les branches, dans
leur sens est le même qu'il se divise en deux savoir le condyle et le rayon,
les deux sous articules et joints du bord à trois os du poignet, et les trois à
quatre, et enfin les quatre au doigt qui sont un nombre de cinq, en comptant
le pouce, cela devroit être ainsi disposé selon toutes les règles de la
mécanique, et il est impossible que la nature fit autrement, puis qu'il
n'y a pas d'apparence de disposer cinq contre un, sans quelque articulation
moyenne, enfin cela est fort conforme à la méthode de la nature qui dans
toutes ses opérations au plus de degrés, comme on voit aux plantes et aux arbres,
elle produit d'abord le tronc, lequel jette des branches successivement une
après l'autre;

Le bras appelé du mot grec, brachion, et les latins humerus arbor de
l'arbre et comme la base et l'appuy de tous les autres
de la main. C'est pourquoy la nature, la fait le plus grand, le plus gros,
le plus fort, et le plus ferme de tous les autres, il faut y considérer les deux
extrémités et son corps au milieu;

En la partie supérieure on remarque une épiphise en forme de
vase ronde et assez considérable revestue d'un cartilage fort épais,
doux et glissant sur elle-même et posée sur une apophise que nous nomme col,
lequel est fort court, la base a en dedans une fêlure ou échancrure,
où passe un des tendons du biceps plus bas que le col, trois ou quatre
doigts, ou voir, un enfoncement qui est pour l'insertion du
deltode.

Humérus est articulé par cette cavité avec l'omoplate, mais par une
articulation toute particulière et bien différente des autres, car partout
ailleurs la tête est reçue, et tenue dans une cavité osseuse, mais ici
la cavité est trop plate pour recevoir une si grosse tête, enfin
la tête est enfoncée dans une cavité toute membraneuse en façon
de capsule, mais il faut remarquer que le dehors de la tête n'est point
recevée de cette capsule, cette membrane prend de la circonférence

de la cavité de l'omoplate.
 par les os concaves fort bien avec quelle extrême facilité le bras se peut
 mouvoir en tous sens, car dans l'articulation, on trouve de la cavité avec
 l'échion les sept os de la main et de tous les os mais le
 mouvement est borné en quelque manière, car nous ne pouvons la
 porter en haut en devant et derrière, et vers les côtés que jusqu'à
 un certain point, à cause que les bords de la cavité osseuse ne
 permettent point à la tête de passer outre, & puis porter le bras
 tout à fait en haut l'étendre tout à fait et le porter en devant sur la
 poitrine et en derrière sur le dos, mais enfin que dans les mouvements
 violents cette capsule ne cedat trop, et que le bras ne se disloque
 la nature a pourvu à une bonne parure d'un os en une loge ordinaire
 qui vient de l'épaule et de tous les muscles qui servent aux
 mouvements du bras, et cette capsule n'empêche point et ne diminue
 rien la facilité que le bras a de se mouvoir.

Si on tire de l'utilité de cette articulation, elle a aussi de grands
 inconvénients car vous concaves fort bien que la tête de l'humérus
 se disloquera plus facilement que si elle étoit reçue dans une cavité
 osseuse et cependant cela empêche la traction du bras en bas comme
 nous le nous de l'ourdi par de haut, mais combien souvent nous nous
 appuyons nous entiers sur nos mains, notre bras qui soutient tout le
 reste du corps doit être repoussé en haut avec beaucoup de force, et
 par conséquent, il est fort dangereux que cette bête ne se disloque,
 et que le bras ne se disloque, à quoi la nature a pourvu par une
 fort belle mécanique, car nous avons remarqué à l'omoplate
 deux apophyses une dite acromion, l'autre coracoïde, lesquelles
 sont comme deux pieux qui envoient mutuellement des ligaments
 de l'une à l'autre, de sorte que quand nous portons ainsi notre bras
 en haut la tête ne se lâche sous cette voûte que les deux pieux
 forment avec leurs ligaments en manière de cavité osseuse, et
 c'est ce qui a fait dire soit d'un commun consentement à tous ceux
 qui entendent la pratique que les os du bras ne pouvoient se de boquer
 de ce côté que par la rupture de ces deux apophyses.

l'humérus se termine en bas par une base fort large à cause de laquelle
 doit s'élever trois éminences qui sont médiocrement grosses qu'on
 appelle pour le bien connoître, soit une coracoïde latérale, dessous les
 flexisseurs du bras prennent leur origine, et l'autre on nomme l'externe
 du bras prend son origine les extenseurs du bras, on remarque outre



ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. 14

plusieurs choses: dans cette extrémité, on remarque 1^o deux éminences, et une
cavité au milieu pour son articulation avec le coude; 2^o une petite
cavité en devant qui reçoit une petite éminence du coude dans la flexion,
3^o une autre et cavité plus considérable qui dans l'extension du coude
recevra le coude, enfin on remarque une petite fosse sur laquelle le
rayon qui a une cavité en son extrémité supérieure comme nous
devons pour à l'heure qu'il va voler comme sur un pivot en quelque situation
qu'il se trouve.

L'humérus à son corps fort creux, on l'a beaucoup de moëlle, et ses
extrémités poreuses et spongieuses, il est assez rond en son milieu en
dedans et l'anneau en dedans, en sa partie extérieure, on voit une fosse ou
cavité où s'attache le brachial externe, en fin il a trois articulations
deux genoux, un avec l'omoplate et l'autre avec le rayon, et une
charnière avec le coude. passons maintenant à l'autre bras ou coude.

L'autre bras est fait de deux os savoir le coude, et le rayon qui
sont comme les premiers rameaux que jette l'humérus et sont des
os qui sont assez longs et assez solides, mais qui ne sont pas si gros que
l'humérus.

On me demandera pourquoi la nature a fait l'autre bras de deux
pièces et non d'une seule comme le bras, la nature nature a l'extrémité
avoir peut-être bien peu faire de ces deux os un seul et l'articuler avec
l'humérus par un genou pour obéir à tous les mouvements que cette
partie doit faire, mais il falloit commencer la ramification du bras
en que deux s'attachent d'un os à deux, et ainsi successivement
pour venir enfin à l'extrémité qui est les doigts, il falloit encore ce qui
est le plus considérable placer plus de vingt muscles pour tous les
mouvements auxquels la nature a destiné l'autre bras, il falloit
donc lui donner quelque largeur, et c'est pour cela que la nature a fait
le coude et le rayon pour faciliter encore davantage, cette juste
situation, elle les a fait lambes, et d'une figure semblable à un
triangle triangulaire, à trois faces, afin qu'en
multipliant les surfaces elle augmente l'espace et la largeur, elle a
encore fait en sorte que les parties intérieures qui se regardent s'appliquent
et se réunissent en points ou plissent en lames, assez minces, enfin elle les
a éloignées dans leur milieu non seulement pour empêcher qu'ils se
rompent l'un l'autre en cas qu'ils fussent pressés par quelque cause
que ce puisse être, mais en core pour une grande distance et plus
commode assise aux muscles, c'est aussi pourquoi elle a mis en

2.
est envoie un fort et large ligament qui va de l'un à l'autre et occupe
tous les pores qui est entre deux, lequel ligament fait l'office des, car il
soutient plusieurs muscles, examinons à présent les deux parties
chacune et voyons de quelles os se composent.

le coude est dit ainsi à la bande, parce qu'on prétend qu'on s'appuie sur
luy quand on medite, on l'appelle aussi ulna, parce qu'elle a une queue que les anciens
se servaient pour mesurer ce que leurs autres n'avoient pas plus grandes, enfin
l'os. La petite le grand fémur il y faut remarquer les deux extrémités
et son corps au milieu.

l'extrémité supérieure est beaucoup plus grosse et considérable que
l'inférieure, il y faut remarquer d'abord deux cavités et une éminence
au milieu pour le ginglyme, et son articulation avec l'humérus ce qui fait
qu'il n'a que flexion et extension en sa partie postérieure, il y a une
apophyse fort considérable d'une oblique laquelle est reculée dans l'extension
Comme nous avons dit dans la cavité grande aussi dans la partie
postérieure de l'extrémité inférieure de l'humérus, et à la partie antérieure
se voit une autre apophyse, mais beaucoup moindre et plus petite qui
entre dans la flexion dans la cavité antérieure de l'humérus, outre
cela on remarque dans la partie interne une petite cavité ou trou
le bord de la cavité du rayon, et un peu plus bas il y a une éminence
qui reçoit le tendon du brachial interne.

son extrémité inférieure reçoit quelque os du bras avec qui il se
joint par genou qui a un mouvement fort sensible, outre cela elle a
deux éminences ou saillies une extérieure et fort pointue qui pour le
sujet est dite ulnaide, laquelle sert à arrêter et contenir le poignet dans
la flexion, et empêcher la dislocation en dedans la saillie interne est
une petite tumeur ronde qui est reculée dans la cavité du rayon.

le coude de l'os ex-ade. blide, un peu voilé, et a la figure d'un prime
triangulaire c'est dire à trois angles.

Cet os a plusieurs articulations la 1^{re} avec l'humérus par charnière;
la 2^e avec le poignet par genou; la 3^e avec le rayon laquelle est double
l'une en haut et l'autre en bas; mais toutes les deux par un genou qui n'a
que le seul mouvement de pronation et supination, ou pour mieux dire
circulaire, le coude est articulé avec le bras par ginglyme, et non par
arthrodie, afin que comme il doit faire des mouvements divers, et forts
comme lorsque nous embrassons quelque corps, par exemple pour le lever ou
remuer, il soit ferme, et qu'il ne puisse point se tourner de côté. lequel
arriveroit s'il étoit articulé par arthrodie, et alors notre effort
seroit nul et inutile, mais afin que l'autre bras puisse se tourner de



desous après incertaines occlusions pour obéir aux mouvements de la main,
la nature en se compense à articuler le rayon avec le bras et le coude
par arthrodie qui luy donne, en quelque enquelque situation que
l'avant bras se trouve, la liberté de faire des mouvements de pronation

et supination,

Le rayon ainsi dit a cause qu'il a la figure d'un rayon d'une roue
de charrète, à son extrémité sup^{re}. plus petite que l'inférieure et on s'
peut remarquer une apophyse qui se termine en une lamelle plate et
superficielle et assez semblable à celle de l'omoplate, laquelle reçoit une
éminence de l'humérus, toute la circonférence et bord de cette lamelle sont
fort ronds et polis pour rouler avec plus de facilité dans la cavité que
nous avons remarquée au coude qui reçoit le rebord, et luy sert de moyen
un peu plus bas on voit une éminence qui reçoit le tendon du biceps. —
remarque il y a un ligament qui de vient quelque fois cartilagineux,
lequel sert à affermir l'articulation du coude avec le rayon.

L'extrémité inférieure de cet os a deux lamelles pour deux os du carpe et
une troisième pour se lever l'éminence du coude, et enfin une apophyse
saillante qui empêche la luxation du poignet en dehors.

Son corps ou partie moyenne est de même structure que celle du coude.

Le rayon est articulé avec l'humérus par genou, avec le coude sans
en haut qu'en bas et avec le poignet par genou, ainsi ouvre les
mouvements d'extension, et de flexion, qu'il a de commun avec le
coude, il a la pronation et supination en particulier par le moyen
de cette arthrodie avec le coude, et l'avantage qu'on tire de cette
articulation, et de ses mouvements est de porter la main à la bouche
donc vient qu'il n'y a que les seuls animaux, qui ont la pronation
et supination qui le puissent faire.

Voilà voilà que ce que nous venons de dire que la structure et le volume
des extrémités du coude, et du rayon sont différentes, mais que la supérieure
du coude est beaucoup plus grosse que l'inférieure et tout au contraire
l'inférieure du rayon est de beaucoup plus grosse que la supérieure, il est
bien aisé de concevoir qu'il falloit que cela fut ainsi puis que l'extrémité
supérieure du coude est le centre, et l'appui des mouvements du coude, et
que l'extrémité inférieure du rayon est la base et le fondement des mouvements
du rayon, il falloit donc bien que les parties fussent plus grosses puis que les
dehors de l'os de l'os et de moyen, et les autres parties plus petites puis que les
ne devaient servir que de soutien.

Il y a une chose à remarquer dans le mouvement du rayon qui est
pronation et supination, à savoir qu'en haut le rayon a une éminence

qui comme l'essieu roule dans la cavité du coude qui lui sert de moyen, au lieu qu'en bas le rayon d'une cavité qui sert de moyen, et le coude à une éminence qui sert d'essieu, et cependant le rayon roule à mont et sur l'apophyse du coude contre toutes les règles ordinaires de la mécanique, puisque malgré toutes les apparences le coude est immobile quand le rayon se tourne.

Le poignet proprement pris est divisé en trois parties, savoir le carpe - les osselets, le métacarpe et les doigts.

Le carpe ou poignet est composé de huit pièces disposées en deux rangs de telle manière pourtant qu'il y en a quatre à la deuxième rangée qui regarde les doigts et trois à la première qui regarde le coude, car il y en a un qui est hors du rang et posé sur les autres au dessus du petit doigt, de sorte qu'il se tient par dessus, et répond à une éminence que le 1^{er} de la 2^e rangée a, et il y a un ligament qu'on nomme annulaire qui va de l'un à l'autre et forme par le moyen une espèce de voute par où passe les tendons des fléchisseurs des doigts.

Les trois du 1^{er} rang se joignent au radius, et au cubitus par genou, et les quatre du 2^e rang avec le métacarpe à peu près de la même manière, on par articulation synoviale comme disent les auteurs, mais les articulations tiennent plus de la charnière ils sont joints entre eux quelques uns par genou, mais presque tous par charnière affermie par de forts ligaments qui les tiennent unis ensemble.

Ces huit pièces sont arrangées d'une telle manière qu'elles font une connexure en dehors, et un creux en dedans pour faciliter l'action de la racine qui est de prendre, et pour faire la base de l'organe, afin d'y pouvoir fermer et contenir ce que nous y voudrions, leur figure est fort inégale et raboteuse quelques uns disent qu'elle ressemble à un morceau de promèdequin.

La nature a fait le poignet de huit os afin que son mouvement se fît en tous sens, c'est une chose merveilleuse que cet artifice, il falloit que cette partie fût dure et solide, cependant, il falloit qu'elle cedât de tous côtés, et le carpe se doit plier et replier en tous sens, au plus au moins que si l'avoit été de fer, la nature la donc fait de huit petits os qui sont joints ensemble assez lâchement obéissent et pressent facilement de tous côtés et cèdent par conséquent à tous les mouvements que nous voulons faire, outre ces avantages cette mécanique rend le mouvement du carpe bien plus doux que si l'avoit été que d'une ou de deux pièces dans lequel cas il n'aurait pas manqué d'être trop aigu et très incommode.

Furme d'une
cette partie de la main
comme le charnière
est conçue




le metacarpe est composé de quatre os plus grands qu'aucun de ceux qui composent la main proprement dite, ils s'appuyent les uns sur les autres à leurs extrémités pour plus grande force, et se partent en leur milieu pour loger les muscles interosseux, ils sont convexes en dehors et concaves en dedans, en haut ils se terminent par plusieurs petites saillies ou caries qui font des ginglymes avec la deuxième rangée des os du carpe, ce qui fait que leur mouvement est fort obscur, et bas, ils se terminent par de petites saillies ou caries qui font des ginglymes avec la 1^{re} phalange des doigts, d'où vient que le mouvement de cette phalange se fait en tous sens.

Les doigts sont cinq et leurs os sont quinze, trois à chaque doigt qui, sous deux phalanges d'un mot grec qui signifie bataillons des soldats macedoniens, parce que ces os sont longs, nets, choisis et mis les uns après les autres de même que ces bataillons, tout le monde sait que leur grandeur est inégale, celui du milieu étant le plus grand et qui est le plus distinct et séparé dans les mains qu'aux pieds pour faire des actions différentes, on remarque dans la partie interne un petit enfoncement ou coule le tendon de leurs flexisseurs, et de chaque côté de cet enfoncement on voit une ligne d'os tend et unit le ligament qui enveloppe le tendon, la 1^{re} phalange est articulée avec le metacarpe par genou, d'où vient qu'elle a indifféremment le mouvement de tous sens, mais les autres sont articulées par ginglyme, ce qui fait qu'elles n'ont que le mouvement d'extension et de flexion, l'articulation de la base du pouce est de la même nature que celle des autres doigts, on peut pourtant dire qu'elle n'est plus du ginglyme que du genou parce que quand les autres doigts sont fermés pour en saisir quelque chose, il semble que le bout du pouce ne soit que pour les presser encore davantage pour rendre leur action plus forte, et enchaîner quelque chose à l'extrémité, et de la manière que les choses sont disposées, il suffiroit de la charnière pour cette fonction.

Les doigts sont faits de plusieurs pièces pour être plus forts, et pour la différence de facilité du mouvement au quel ils sont destinés, s'ils eussent été tous d'une pièce, on n'auroit pas été possible qu'ils eussent rien pu, il a donc fallu les faire non d'un seul os, mais de trois attachés l'un à l'autre à chaque articulation pour cette raison qu'ils puissent se figurer d'une façon propre et commode à chaque action, car tous les os joints ensemble, nous servent des doigts, comme s'ils n'étoient joints d'un seul, et quand ils sont étendus comme s'ils étoient joints.

innent ou enfin quelque fois il ne faut plus qu'une jointure quelque fois deux jointures soit, selon le besoin ainsi nous agissons, et dressons nos doigts de quelle manière que nous voulons.



Je ne serai pas mainant de remarquer icy que la nature a garny le dedans de la main proprement dite de chair, et de gros sangs de graisse elle n'en a point mis au dehors parce quelle y faisoit du poids inutile, mais en dedans pour fortifier l'action des doigts car ils servent avec bien plus de force que si n'en avoit point, car nous les empoignons de tous costés et elle s'accomode par la souplesse aux differantes figures des choses que nous voulons prendre, de mesme que les artisans quand ils veulent serrer fortement quelque corps entre le roc, ils mettent du charbon ou du fer entre deux, maniere a peu pres semblable a la chair et a la graisse des doigts.

Mais remarquez que cette substance charnue et grasse est tellement disposée en dedans quelle ne se trouve point aux jointures, car elle seroit incommode dans la flexion occupant l'interieur de la jointure, mais qui se trouve seulement entre les jointures et aux parties laterales des doigts autant qu'il est necessaire pour remplir les espaces qui sont vuides, quand il est necessaire en serrant et approchant les doigts, en effet la peau qui est entre deux est tellement garnie de chair, et remboursee de chair que nous pourrions venir de l'eau dessus nostre main renversée sans quelle coule. adionnez y que les ongles qui bordent les doigts servent a faciliter la prehension et l'approche au corps, de mesme que de pointes d'outils, remarquez que les mains ont esté éloignées du reste du corps, afin que nous puissions les porter plus loing, et servir les parties de nostre corps pour les besoins et que enfin elles ont esté attachées a de longs tendons pour estre plus fortes, jussion a la main inférieure.


On a fait voir en expliquant la mécanique de la main ou extrémité supérieure quelle se divisoit en trois. l'avant bras, le bras, et la main proprement dite, on fit aussy remarquer que toutes ces parties en traittoient comme un arbre avec ses rameaux, que l'humérus estoit la base de toutes les autres, et la racine de tous les mouvements que l'humérus estoit le tronc de cet arbre qui estoit d'un costé deux rameaux ensuite trois, puis quatre et en fin cinq, enfin on fit remarquer assez clairement l'ensemble qui en bonne mécanique on ne peut disposer cinq leviers sans l'interposition de quelque articulation moyenne nous suivrons la mesme route en parlant des extrémités inférieures a qui on a donné le



le nom en general de pied qu'on dit être comme la main en trois, savoir la cuisse, la jambe et le pied proprement dit, on doit regarder toutes ces parties comme un arbre avec ses ramifications et la cuisse comme la base des autres et l'appuy des mouvements, enfin comme le tronç et le gros de l'arbre qui porte d'abord le tibia et le péronné, ceux ci sont suivis du fémur, le tarse du métatarse et enfin des phalanges des doigts, la rotule qui est un os rare et spongieux, peut fort bien être considérée comme un champignon qui naît à la rencontre des os de la cuisse, et de la jambe, la nature n'a seulement pas fait l'extrémité inférieure de tout, mais pour les raisons que nous avons apportées en parlant et expliquant pourquoi l'extrémité sup.^{re} étoit de trois os, mais pour d'autres raisons bien plus considérables que nous rapporterons dans la suite, car de la structure de tous ces os, nous nous nous entretiendrons, et après en avoir examiné l'artifice, nous nous étendrons fort au long sur la progression ou allure des animaux, et sur tout nous faisons tous nos efforts pour démontrer exactement la disposition des organes qui rendent celle de l'homme si commode et si facile, enfin nous demandons en raison mécanique de la facilité qu'il a de se tenir debout et de savoir à la différence de plusieurs animaux, et pour ne point perdre de temps commençons par la cuisse. La cuisse de même que le bras n'est faite que d'un os, mais le plus gros et le plus long de tout le corps et à qui il faut examiner les extrémités supérieures et inférieures et son corps.

on remarque dans son extrémité supérieure trois choses savoir, la tête, son col, et les apophyses, la tête fort ample et ronde, entre dans la cavité de l'ischion qui lui est proportionnée et faite plus considérable genre arthrodie de tout le corps, outre les ligaments qui affermissent et soutiennent extérieurement cette articulation, il y en a un très fort qui prend du fond de la fosse de l'ischion, et vient s'implanter au milieu de la tige, lequel est d'un merveilleux usage pour empêcher son dérèglement, cette tige est une épiphyse, mais il est presque impossible de la détacher du reste de l'os, elle est comme toutes les autres enduite et recouverte d'un cartilage polé et glissant qui facilite les mouvements.

La tête du fémur est soutenue sur un col qui est une apophyse ronde, longue, et oblique, ce qui fait que la tige fait un angle considérable avec le corps de l'os pour aller rencontrer la cavité de l'os des isles qui n'est point surfaite à cet effet et par cette mécanique la nature a voulu l'entrecroiser des os plus large pour y loger plus commodément



les muscles, et pour empêcher qu'ils ne se froissent l'un contre l'autre, et blés adont par le moyen les parties genitales particulièrement des mâles, par une mécanique elle a aussi éloignée les os apophytes, trochanters, du point de l'épau qui est dans le creux de la cavité de l'ischium lequel augmente notablement les tendons par le moyen desquels les muscles font leurs actions, et leurs forces par conséquent en sont plus grandes, et le quittement des esprits beaucoup moindre, enfin cela nous donne une plus grande facilité à porter la cuisse en dehors, les apophytes sont de deux, une extérieure, l'autre intérieure, dit le grand et le petit trochanter, le grand a une cavité à la racine du fémur les quadrifémoraux, et les autres, on y remarque encore quelque trou qui donnent passage à des vaisseaux.

La partie supérieure s'élargit, se dilate, et se termine enfin en une grosse épiphysse qui a deux condyles, un intérieur, l'autre extérieur, et une cavité qui est au milieu et qui est fort considérable, et qui reçoit une petite éminence du tibia, au-dessus, on y voit une enfoncée dans une goutte, et un ligament qui se tend, un singulier au tibia comme celui de l'ischium ou fémur et en sa partie antérieure, il y a deux éminences, et une cavité par son articulation ginglymoïde avec la rotule.


Le corps du fémur est rond à l'extrémité en la partie antérieure, et s'élargit en sa postérieure, où il y a une ligne qui se divise et se repart en deux pour aller à chaque condyle de son extrémité inférieure il est creux comme l'humérus et contient beaucoup de moelle comme lui.

Il est bon de vous faire remarquer l'erreur où sont tombés quelques auteurs, qui ont dit que le coude des animaux à quatre pieds se fléchit en dehors, et leur genou se fléchit en dedans, la cause de leur erreur en qu'ils ont pris la jambe de ces animaux pour leur cuisse qui est presque toute cachée dans leurs fesses, et que les qu'ils appellent le coude. Dans les pieds de devant on proprement le carpe, et que les qu'ils nomment le genou dans ceux de derrière on véritablement le tarse.

Les os de la cuisse est articulé par en haut avec les os innominés par un genou très considérable et par son extrémité inférieure avec le tibia par ginglyme, ou, charnière. Les auteurs qui ont remarqué que les os articulés par ginglyme n'ont que flexion, et extension et qui, le font pourvoir après eux que le tibia se mouvait sous le fémur à droit et à gauche ont dit qu'ils étoient articulés par un ginglyme lâche; mais il est presque aussi ferme que les autres, et c'est par cela qui lui donne cette facilité,



et liberté de mouvement en tous sens; mais voyez la différence et ce qu'il y a de particulier, car que dans les autres ginglimes les eminences et cavités, sont plus considérables et les rebords plus élevés, si bien qu'ils retiennent les os dans les sems d'un mouvement simple, au lieu que icy les eminences sont plus plates, et incapables



conséquents de résister au roulement des os qui peuvent tenir d'une

diverses manieres.

La rotule est un os rond et plat situé au dessus de l'articulation du fémur avec le tibia, son mouvement se fait presque tout sur l'extrémité supérieure du fémur, et son articulation tient beaucoup de la charnière, car elle a deux cavités et une eminence au milieu revêtue de cartilages.

Tous les anciens n'ont point donné d'autre usage à la rotule que d'affermir l'articulation du fémur avec le tibia, et borner l'extension de la jambe et d'empêcher la flexion de celle endeuant, cependant il en démontre en bonne mécanique qu'elle ne peut pas avoir cet usage.

1^o par le fait faudroit pour borner, ou résister le tibia dans l'extension quelle occuperoit toute la cavité antérieure de l'os de la cuisse, cependant elle n'en remplit pas plus du tiers.

2^o L'usage qui lui a été fait une apophyse du fémur ou du tibia comme l'olécrane du coude et quelle fut immobile comme luy, ou du moins quelle ne peut pas monter plus haut que jusqu'à un certain point où elle peut arrêter le tibia, et rien de tout cela ne se voit. Car elle n'est séparée et fort éloignée du tibia, elle monte dans l'extension plus haut que l'articulation, et plus les muscles extenseurs agissent, plus elle monte haut à cause qu'ils y sont fort adhérents, enfin tous les animaux ont à leur genou une rotule aussi bien que l'homme, cependant ils ont le genou plus étendu, donc elle ne peut pas affermir cette articulation, on remarque qu'elle a deux petites cavités et une eminence au milieu, le tout revêtu de cartilages qui sont un ginglime avec les deux eminences, et la cavité du fémur, comme ces aussi de cartilages sur qui elle roule, et quelle est fort étroitement attachée aux tendons des extenseurs pour elle fait le mouvement, et ainsi elle sert par conséquent non seulement de pivot en empêchant qu'il ne se produise l'os en voulant descendre, mais aussi de levier en éloignant par son appui la puissance de la jambe, usage qu'on voit attribuer aux os rétrogrades ce que vous remarquerez en passant, la jambe est faite de deux os de même que le coude ou avant bras, et pour les mêmes raisons ces os sont nommés tibia et péroné.

Ces deux os se touchent par leurs extrémités et se carrent en haut.

l'articulation, on y a un ligament qui va d'un os à l'autre. Il ont la figure
 d'un triangle de même que ceux du coude pour les mêmes raisons
 que nous avons dites qui s'en reprennent point. Il y pourroit y avoir le même
 os du tibia beaucoup plus gros que l'autre est siue et occupe la partie
 supérieure de la jambe. On y remarque l'apophyse est une grosse apophyse au
 dessus de deux cavités qui avec leurs bords ou rebords cartilagineux,
 dont elles sont bordées, reçoivent les deux éminences de l'extrémité inférieure
 du fémur au milieu de ces deux cavités, il y a une éminence qui est
 reçue dans l'une des deux éminences du fémur; et tout cela fait
 une charnière extérieurement, et a l'os, on remarque une petite saillie
 qui entre dans la cavité du peron, et en la partie antérieure une
 tubérosité ou saillie des extenseurs de la jambe.

La partie ou extrémité inférieure d'une apophyse, peut être plus petite
 que la supérieure. Cette apophyse a deux cavités et une éminence,
 l'éminence fait la malleole interne, une des cavités reçoivent l'astragale
 reçoit le peron, l'autre extérieurement pour recevoir l'astragale avec qui
 elle fait une charnière, mais pour le mouvement en osseux, —
 l'apophyse qui fait la malleole interne sert à tenir l'astragale en son
 état naturel, et empêcher la luxation en dedans de même que
 l'apophyse tibiaire du coude ou ulna empêche la luxation du cubitus
 en dedans, la partie moyenne du tibia ou du fémur n'a rien de particulier
 si ce n'est qu'elle est triangulaire.

Le peron est plus petit que le tibia fait la partie extérieure de la jambe,
 il y a une apophyse à la partie supérieure qui est rebordée et lève un peu
 l'extrémité pour recevoir une éminence du tibia l'extrémité inférieure est
 un peu plus longue, fait la malleole externe qui empêche la luxation
 du tibia en dehors, elle entre dans l'extrémité du tibia se joint à
 l'astragale par une articulation obscure.


Le peron ne fait que suivre les mouvements du tibia
 à la différence du rayon, mais en compensation, au lieu que dans l'humérus
 dans le coude ne peut que se fléchir et s'étendre, il y le tibia peut se
 mouvoir à droit et à gauche suivant la nature de son articulation
 avec le fémur comme nous avons dit.

Le pied proprement dit se divise ainsi que la main proprement dite
 en osseux, savoir l'orteil, meta-orteil et les doigts.

Le pied est composé de sept os dont le premier est dit astragale qui
 fait une charnière avec la jambe pour le mouvement n'est pas



très manifeste dans la partie opposée la grosse rem entre dans la cavité
du naviculaire, qui est assez considérable, il est joint avec le calcaneum
par trois ligaments et trois éminences que les os ont presque que nous
est adre un deux éminences et une cavité et l'autre deux cavités et une
éminence, et les mêmes os de toutes les articulations sont fort robustes.



Le 2^e en dit calcaneum ou os du talon est le plus gros de tous les os, et
Nausé les éminences et cavités par lesquelles il est joint de la coracé
il a en sa partie postérieure une saillie qui s'élève quand l'homme
marche, ou en de bout, et a cette même saillie tous les os de la main
l'autre le rend un d'achille. en son extrémité antérieure on voit une
cavité considérable pour recevoir le cuboide, il ne faut pas oublier
les parties latérales pour l'externe en l'autre est robuste et large.
Cavité.

Le 3^e en dit naviculaire d'ordon de la figure, et ressemble à
un navire, il a quatre cavités la 1^{re} est assez considérable qui reçoit
la coracé les 3 autres sont superficielles et reçoivent les trois os de la main
la partie supérieure est inégale et robuste.

Le 4^e dit cubiforme ou cuboide a une forme qui a la figure d'un cube, a
une cavité qui est reçue dans la cavité du calcaneum et de l'autre
dont il est joint aux os du metatars par une articulation qui n'est
plus du genre que de la charnière ainsi que les trois autres qui nous
ont de nom, mais que Fallope a pelté pour nous en ces formes.

Le metatars est composé de cinq os qui sont joints et disposés bien
pres l'un de l'autre, et cela pour rendre le pied plus ferme et plus assuré
en marchant, sa structure est assez semblable à celle du metacarpe,
les os sont articulés avec le tarso de la manière que nous venons de
dire, et avec les doigts par en dessous.

Les pieds ont cinq doigts comme les mains, mais ils sont beaucoup
moins fermes l'un contre l'autre et beaucoup plus courts, ce qui rend les pieds
incapables de la dextérité des mains pour les mêmes actions nécessaires et
commodes à la vie, au lieu que les pieds ne sont que des machines qui
peuvent marcher, si vous exceptez le 5^e qui a le pied de derrière
plus adroit que les mains. Comme nous dirons dans la suite, il y a
encore cette différence entre les doigts des pieds et des mains qui est
que le gros orteil n'est pas si écarté dans les pieds que dans les mains.

moins, et qui n'a que deux phalanges les autres doigts ont au lieu que dans
la main, sous cinq en ont trois chacun, et en velongneuse le metacarpe n'en a
que quatre, et le metacarpe en a cinq l'articulation de la 1^{re} phalange des doigts
diffère avec les os du metacarpe en un genou, celle des autres est une charnière
de même que dans la main.

Il y a bien de si merveilleux que la structure du pied, sous les différents os, d'un
côté les os, d'un autre côté, par des os qui se joignent, que par dessus ils
forment une gibbosité pour la beauté du pied, et par dessous ils laissent une
cavité pour la commodité de ses usages.

Or sous les os sans aux mains quaux pieds, on en trouve d'autres plus
petits, dit à cause de cela les osnoies, Ces os comparent à la queue de l'homme
à qui les anciens ont donné l'usage de servir les articulations comme des coins
leur nombre est incertain, et il y a des auteurs qui ont dit qu'il y en avait à
peu près les jointures des doigts des pieds et des mains, mais il n'y a pas d'apparence
puis que quelque exactitude que nous ayons eu à les chercher, nous n'en avons jamais
trouvés que deux : chaque os de la main et autant de chaque os du
pied, mais il y a des animaux qui en ont à toutes les jointures comme par
exemple aux hommes on n'en trouve quaux pieds de bien remarquables
qui sont formés deux l'un à côté de l'autre sous les os du metacarpe qui soutiennent
les os du pied, et qui laissent une petite espace entre eux, mais qui sont joints
sont joints ensemble par des ligaments, et ne peuvent se séparer l'un de l'autre,
ou quand il ne se rencontre qu'un seul, il laisse au milieu une cavité ou
grosse et s'enchevêtre le tendon, de sorte que cette cavité en est pleine et ne
peut être pressée et écrasée, les os sont encore de plus en plus joints
et est pour cela que la nature les a velongnés de l'articulation, et les a articulés
par vingt et une aux autres os comme la queue, et par cela ils servent encore
de joint dans les animaux mais ils sont joints en joint comme dans les os, l'usage
n'en a point d'autre, aux os du pied, et non celui que les anciens leur
attribuent, qui est de servir à fortifier les articulations des os, mais de servir
à l'explication me l'unique de toutes les différentes pièces qui composent les
pieds.

Comme la structure des os des mains, si commode pour bien aux usages
auxquels la nature les a destinés, la fabrique de la main, de la jambe
et du pied, fait voir très bien les fonctions pour lesquelles les os sont
faits, il n'y a que des animaux qui se servent de leurs pieds pour les mêmes
usages que nous nous servons de nos mains, si ce n'est le singe,
enfin il y a bien apparence que les pieds nous ont été donnés aux animaux
que pour marcher, et que s'ils s'en servent pour d'autres usages comme
le singe de les servir pour la part ou pour d'autres intentions de la nature
la manière de marcher ou d'autres est différente dans les animaux et dans
l'homme suivant la diversité de leurs organes, celle de l'homme est plus



plus belle et la plus noble, on peut dire qu'il est toujours en l'air dans son albâtre,
et qu'il ne se pose point au pied sur la terre, qui ne se mette à terre en même
temps pour avancer, et celui cy n'est pas plus posé en repos que l'autre est en
action, mais comme on ne sauroit comprendre la progression sans savoir

CHIRURGIE que la ligne de direction il faut en dire deux mots, en faire quelques
CHIRURGIE

Hommes debout et assis sur un pied que sur l'autre,
la ligne de direction ou le centre de gravité du corps passe précisément
dans le milieu de la partie inférieure du tronc, droit au perrin et
tombe dans le milieu du quadrat qui est entre nos deux jambes et nos pieds,
c'est à dire que la nature a si bien fait quelle a mis toutes nos parties
en équilibre à côté les unes des autres, et quand il y auroit quelque partie
simple, elle la metroit au milieu. Cette ligne de direction dans l'homme
debout, et qui tient les pieds un peu écartés ayant beaucoup d'instabilité fait que
l'homme est ferme et chancelle fort peu, car elle a pour base tout le quadrat
qui est entre les pieds, quelle peut par là servir en assurance, et c'est là que consiste
l'artifice d'un ^{me} d'armes ou d'un homme qui se bat, car il a besoin d'éloigner
d'appuyer son corps de celui de son ennemy sans bouger les jambes ni les
pieds que le moins qui luy est possible, et pour reprendre l'équilibre lorsqu'il vient
à se perdre, et dans cette occasion tout le danger de tomber consiste en ce que
le centre de gravité peut tomber aitement hors la base de deux côtés à quoy
on remédie en deux manières, la 1^{re} est qu'il pose tout son corps sur
la jambe qui est derrière, et le centre de gravité ne s'en éloigne que très peu,
et le pied de derrière se tourne entièrement et dehors pour que la base soit plus
grande du côté où est le péril de tomber, mais quand les pieds sont fort près
l'un de l'autre, l'homme n'est pas si ferme parce qu'il faut peu de chose pour
faire sortir la ligne de direction quand on ne l'appuie que sur un pied la
ligne de direction y passant et passant tout sur le pied. à la vérité pour
base toute la largeur du pied, mais comme il faut peu de chose pour nous
sortir de cet équilibre, on ne rompt pas mais on tremble. beaucoup si on
ne l'appuie que sur les orteils, la ligne de direction ne porte que sur un point
donc vient qu'il est très difficile de se tenir sans tomber, c'est ce qui fait que
nous les remuons continuellement sans nous en apercevoir pour nous tenir
toujours en équilibre de même lorsque nous marchons sur nos talons le corps
se porte & presque que sur un point, donc vient la difficulté de nous tenir ainsi
c'est ce qui fait que quand nous marchons, comme le centre de gravité doit
avancer nous nous inclinons sans nous en apercevoir la terre et la
prochaine en deuant, et nous ne nous appuyons que sur un pied ce qui se fait
en trois manières la 1^{re} en jetant un peu la jambe gauche, et par ce moyen
le centre de gravité tombe sur cette jambe, et nous avons la liberté de
remuer l'autre et de la porter où nous voulons. la 2^e en allongeant une

ACADEMIE
ROYALE
DE
MEDICINE

jambe et par ce moyen elle pousse l'ensemble, et c'est le centre de gravité sur
l'autre comme nous avons dit; ou enfin par les deux manières ensemble en
valant l'un l'autre, d'où nous savons que quand nous avons les
jambes fort courbées, nous ne saurions avancer que premier nous nous
raprochions nos pieds de ces deux manières.

C'est pour la même raison que dansy pousse quand nous marchons en
arrière pour contre balancer le fardeau verser le poids en arrière car
aussy pour la même raison, qu'étant assis proche d'une muraille nous
ne saurions nous lever tout d'un coup sans nous choquer contre parce qu'il
faut pousser le dos en arrière pour contre balancer le fort que nous oignons
faire en devant; et c'est sur le même principe que les crocheurs
s'avancent en avant quand ils portent quelque fardeau, quoique nous
à la se faire sans se servir par le seul instinct de la nature en qu'on s'efforce
en plus à admirer.

La longueur du pied et la largeur de ses apophyses nous servent merveilleusement
à nous tenir debout, car une des difficultés que les animaux ont à se tenir debout
depend de ce qu'ils ont les pieds fort courts, la nature qui ne nous a donné que deux
doigts les a fait en longueur plus longs, en sorte qu'ils nous servent comme si
nous en avions quatre, car les deux de devant et les deux de derrière.

Un des grands moyens de se tenir debout ferme, et empêcher de tomber est de
se remettre en équilibre par l'allongement des bras, et autres membres, lequel
représentent fort bien les danseurs de corde qui se tiennent d'un fort long et
pesant l'un sur l'autre, sans lequel il leur seroit impossible de se tenir debout, car
si les ligaments n'étoient pas capables seuls de tenir notre corps en équilibre,
et les muscles venant bien incessamment nous les uns sur les autres de la
manière qu'il faut pour que le tout soit en parfait équilibre, mais nous
remarquons cependant que le seul gonflement des muscles n'est pas
capable d'empêcher que le centre de gravité ne tombe hors de la base, et la
raison en est que le principe de la balance est quelle soit en équilibre lorsque
les bras et les poids sont en raison reciproque, c'est à dire que si l'un est en
change avec l'autre, l'un augmentant et l'autre diminuant, le poids se change
à bras de la balance qui est moins fort et long qu'un muscle ou plusieurs
qui ne sont pas gonflés se gonflent, et le bras et le poids sont augmentés
mais de si peu qu'on peut dire hardiment que la force n'est point
recompensée, et que la balance n'est pas en équilibre, et de sorte qu'il est
nécessaire que nous nous servions de nos bras en marchant comme de
l'autre part, et la raison pourquoy nous ne nous pouvons pas lever lorsque
nous sommes assis, c'est que nous poussons nos jambes et nos pieds sous la chaise
ou qu'on nous aide par le bras, et ainsi nous nous mettons en équilibre.



2
La beauté du marcher, et du danser depend de la dresse qu'on a eue pour les articulations, les doigts ouvre le genou quand ils sont de pour verser des les anodes, la nature y supplée par de petits cartilages polis plus la saillie du callaneum que plus on saute loing.

ACADEMIE ROYALE
DE CHIRURGIE
C N

Il faut remarquer que nos os ne se touchent et ne se joignent les uns sur les autres qu'en un point de sorte que le moindre effort les uns, meisme le battement des artères les peuvent faire sortir de leur point, et qu'ainsy il faut que nos muscles qui sont comme bandes et tirent les uns les autres les remettent incessamment dans leur lieu, et place, sans quoy nous ne pourrions ny marcher, ny nous tenir debout, et c'est ce qui fait que nous changeons continuellement nos os l'un sur l'autre, et que nous sommes continuellement en mouvement.

Il faut aussi sçavoir que les os de la cuisse ne s'appuyent dans la cuisse que sur un point que l'on appelle le point de la cuisse, et que les muscles s'appuyent à son autre apophyse qui est opposée, ils sont d'autant plus éloignés du centre de l'appuy, qu'ils sont dans la cuisse de l'autre, et que par conséquent ils ont plus de facilité de le mouvoir.

Comme il ne suffit pas pour marcher que les os se tiennent, mais qu'il faut que les colonnes s'appuyent sur une planche plate, soutenue sur un pied fourchu, comme sur une planche plate mais ronde et enroulée de terre, le 1^{er} est l'homme et le singe, le 2^e les animaux ruminants, le 3^e le cheval.

Le marcher se fait donc en s'appuyant sur un pied et venant la cuisse l'instrument de l'appuy est le pied et du mouvement la cuisse, de sorte que dans le pied l'appuy qui nous soutient est de deux qui est que la disposition des os nous permet de tourner arriement en dehors afin de rendre la base de notre corps plus large, et plus capable par conséquent de nous soutenir, et dans cette situation pour marcher on fléchit une cuisse, et le reste de la jambe suit son mouvement, et tandis que cette cuisse est ainsi en l'air, il est bien aisé que le centre de pesanteur est sur le pied qui pose à terre, et que nous sommes libres de l'autre lequel on s'allongeant fait comme le bras du balancier les os se poussent contre terre nous poussent la terre du corps, et le centre de gravité au delà du pied qui est en repos lequel nous oblige pour nous empêcher de tomber de porter le pied qui est plus loin que l'autre, et alors le centre de pesanteur est fait de même. Comme on voit le cheval par son pied nous transportons alternativement la jambe droite ou la gauche, et par là nous nous appuyons sur le soutien de notre corps, la cuisse qui remue principalement dans la progression, et la cuisse et les jambes et les autres parties ont remuées.

1
j'ay dit qu'on transportoit le centre de gravité un peu au dela du pied
qui pose à terre, et cela pour faciliter le mouvement de le meme pied qui
doit suivre incontinent pour faire le second pas, d'où vient qu'on nous
arreste dans le temps que le pied est en l'air nous tombons facilement le
pied nous entraînant en devant, et la raison en est évidente, c'est que dans ce
temps la force que le pied qui pose à terre exerce sur notre corps
est plus grande que la force de notre impulsion en avant, il en résulte que

de la force de nous élever, c'est pas pourtant que le pied qui est en l'air
ne serve d'un grand contre poids pour balancer le corps dans notre allure,
c'est assez ce qu'on comprendra aisément. Si on considère que nous
sommes plus fermes dans le temps que le pied qui est en l'air est en l'air,
de celui qui pose à terre, que lorsqu'il est en l'air, et qu'il est en l'air
parce qu'en l'air la force de la terre à nous attirer est plus de terre
d'un côté que de l'autre, au lieu que quand le pied qui est en l'air est
en l'air de celui qui pose à terre, il ne du moins le corps en un assez
juste équilibre.

nous portons par tout toujours le pied qui est en l'air de celui qui
pose, parce que si nous ne le portions que tout à l'air, il nous attirerait
la même chose qu'un boiteux qui ont une jambe trop courte, comme
progression s'en voit interrompue, l'encre pour ces autres difficile.

Vous voyez donc par ce que nous venons de dire l'utilité que nous tirons de
laque nous pieds généralement sont faits de plusieurs pièces, car car
ils en ont une autre pièce, on ne laisse pas à la nature de marcher
mais on perdrait bien du temps inutilement si on se fatiguerait beaucoup,
parce que nous serions obligés de décrire un grand cercle de même que
aux qui marchent sur des échasses, et il nous seroit impossible sans le
contour de porter le pied en devant, enfin pour un pas que nous faisons
assez vite, et avec assez de facilité, il en auroit fallu faire plusieurs
avec bien de la peine, la nature a donc remédié à ce défaut par le
moyen de ces trois articulations, car s'il n'y avait que deux, nous
devrions en devant, il n'y a qu'à le valoir, et pour cela nous fléchissons
la main le genou de nous relever, on ne s'en rend pas compte, mais plusieurs autres avantages
de ces articulations, particulièrement quand il s'agit de monter de degrés
par exemple, monter n'est que marcher la brièvement pour l'un et pour
quand de nos pieds soit étendue, et c'est celle des qui pour le corps
s'appuie sur la terre, et elle pour monter le pied
lorsqu'elle est arrivée, celle qui est étendue sur le pied pour
le faire, et celle qui est étendue pour porter le corps à l'autre
c'est celle qui est étendue pour porter le corps à l'autre



estoit d'une seule piece, il nous seroit impossible de nous mouvoir en —
cette posture, car la main droite sur laquelle se repose le bras droit, —
pourroit se rompre, et de même la main gauche sur laquelle se repose le bras gauche.
Il ne pourroit sans un effort vers le intérieur tout le poids du corps
se porter au lieu que les différentes pieces, comme des leviers,
se joignent, le pied tendu sur le degré inférieur se trouve soutenu de celui
qui est sur le supérieur à cause des flexions, de ce dernier qui venant à
se fléchir monteroit sur un degré encore plus haut, et ainsi successivement
en venant presque à l'appuy qu'il n'y auroit rien de perdu en passant de
l'un pied à l'autre, ou qui ont les doigts coupés peuvent bien encore se tenir de bon
marcher comme les autres, mais quand il s'agit d'aller dans des lieux
inegaux, raoureux et dans des descentes, il ne leur en revient pas possible
de marcher sans tomber, ceux à qui le tarse et le métatarsus ou plusieurs
des pieds sont corrompus ou gâtés par quelque cause que ce soit ne
peuvent marcher en levant, car il leur est même bien difficile de se
tenir de bout sans beaucoup chancler, il est donc clair par là que les
pieds de l'homme ne sont longs et amples que pour qu'ils se tiennent
fermement dessus, et qu'ils marchent avec assurance, voyez une
exemple qui fait toucher au doigt l'usage de toutes les parties quand
un homme marche sur une échelle, dont les échelons sont petits et espacés
avec la largeur du pied il embrasse la profondeur de l'échelon, —
ensuite il la terre de ses deux talons. L'usage des doigts et du talon avant
qu'il ne se fait la marche de son pied tendu, servant comme d'une
main l'échelon qui est au dessous, ainsi les pieds servent de soutien au
corps, parce qu'ils sont longs, larges et molles par leurs carnes et —
embrassent et servent tout ce qu'ils trouvent de minces et de raoureux,
et avec leurs doigts s'attachent sur les montaignes, vallées et autres lieux
obliques, ainsi l'usage du pied est en quelque façon semblable à celui de la
main, en effet ils ont chacun trois parties, mais elles sont différentes
à l'égard des doigts, car icy le pouce n'est point à l'opposite des autres
parce qu'il n'a point de ses os de la même manière, mais il est
à l'opposite de la main, et de la même manière.

Le talon, ou os du talon a de tres beaux usages, car il sert point
surtout pour marcher, comme d'un levier, et d'autre manière pour
le soutien du corps quand on est debout, quand on remonte une escelle de bois
pour l'appuy du levier est à l'opposite la puissance musculaire, et le
point d'appui est le talon, mais quand on se penche sur la pointe du pied
le talon fait cette puissante action qui est de soutenir tout le corps par le
levier puissant tendon d'Achille lequel le favorise en l'appuy du levier qui
est à l'extrémité des pieds, ainsi la puissance qui est au talon, se trouvant
fort éloignée du centre de l'appuy a d'autant plus de force, et est pour cela

levez en même temps, & sont enfoncés dans des gaines de la peau de la tête comme
les dents dans les alvéoles ou les plumes sont formées comme elles, ce qui fait
que la liqueur qui est filtrée dans cette gaine par les artères et qui s'y mêle
avec les sucs nutritifs, coule sous le long des fibres osseuses du ruyau
sans avoir le secours de la plume.

La queue n'a pas moins de structure en son dedans. Comme le ruyau, elle
est creuse à l'intérieur comme lui, mais en de longueur la nature
est au dehors, c'est-à-dire à la surface sous lequel y avait de solide et
a fait le milieu spongieux pour la légèreté, car les plumes devaient avoir
une force fermière et légère, inépuisable.
Cette queue est garnie de une douzaine de barbes ou de
un seul singulier et peut être le plus beau qui se trouve dans la nature,
en effet quand on se donne la peine de les regarder avec le microscope
ou même simplement avec les yeux on s'aperçoit qu'elles ont la figure d'une
allumette de bois. Pour le mieux regarder la terre et les dards
de terre qui sont attachés à la base d'une d'entre elles peuvent bien
se mouvoir facilement le long de la plume, soit du côté du ruyau ou de
l'extrémité, mais s'arrêtent en haut, et en bas, & qu'elles auroient peu
faire si elles eussent été placées selon leur longueur, ce qui auroit nuit
extrêmement pour ne pas dire tout à fait empêcher le vol, il faut
encore remarquer que les barbes sont tellement proches les unes des autres,
et si serrées qu'elles ne permettent point d'air de se chaper entre
elles quand elles frappent et s'appuyent dessus, ce qui auroit aussi
extrêmement nuit au vol, ainsi qu'il est facile à tout le monde de
concevoir, mais ce n'est pas le tout, la nature ne s'est pas ainsi des
ouvrages imparfaits, car si par hasard elles venoient à se déjoindre et
se séparer, par quelque cause, elle a tellement disposé
le tout, que le ruyau avec sa barbe se remette dans la même place
facilement par le moyen de petits crochets qu'elle leur a donné, de sorte que
celles de la partie inférieure se relient dans celle de la supérieure, et ainsi
pour peu que les barbes s'appuyent, elles se crochent facilement. On a vu
à fait dire à plusieurs modernes que les oiseaux prennent avec leur bec une
goutte d'eau, qu'ils la portent au-dessus de la langue, & d'autres que le ruyau
auroit cette goutte dans son bec, et enfin d'autres que les barbes estoient
enduites d'une humeur visqueuse et huileuse, et qu'ainsi les barbes
s'approchant elles se réunissent et collent ensemble.

Vous voyez donc bien par là que cette structure convient très bien à
l'usage qu'elle doit servir à faire, car elle doit faire effort pour attirer
l'air, & ne la laisser pas s'échapper, & d'autres qu'elle la fasse
échapper l'air ne qu'elle se déjoignent quand.

quand l'air est pur, il se lève les ailes et s'abatte pour les ébranler
 le gilet l'enverner, il s'élève, et s'élève un peu en l'air, ou en s'abaissant les ailes,
 et de l'air comme un arc qu'il étend et le tend autant qu'il peut pour occuper
 plus de place l'air pour pouvoir ainsi se faire voir et s'élancer. Il s'élève
 fort en l'air, et ainsi fait des sauts et sautonne l'air alternativement
 d'un côté et de l'autre il ramène la tête en bas et de là il se relève pour se
 relever et se lève quand il veut se relever en l'air.

De voir comment l'air se lève et se baisse, et comment il se lève et se baisse
 quand il se lève et se baisse.

C'est le cas de deux sortes de plumes arrangées avec la même couche
 la même couche de plumes d'une de dire et ainsi successivement les plumes
 sont toujours internes et les plumes de la peau et les plumes externes, les plumes
 conservent la chaleur, car il ne faut pas tomber dans l'erreur du vulgaire qui croit
 que les plumes de la chaleur ou du froid sont comme les plumes de la chaleur, mais
 mais venant les plumes de la chaleur qui sont de la chaleur, et de la
 conservent-elles la chaleur.

C'est le cas de deux sortes de plumes arrangées avec la même couche
 la même couche de plumes d'une de dire et ainsi successivement les plumes
 sont toujours internes et les plumes de la peau et les plumes externes, les plumes
 conservent la chaleur, car il ne faut pas tomber dans l'erreur du vulgaire qui croit
 que les plumes de la chaleur ou du froid sont comme les plumes de la chaleur, mais
 mais venant les plumes de la chaleur qui sont de la chaleur, et de la
 conservent-elles la chaleur.

C'est le cas de deux sortes de plumes arrangées avec la même couche
 la même couche de plumes d'une de dire et ainsi successivement les plumes
 sont toujours internes et les plumes de la peau et les plumes externes, les plumes
 conservent la chaleur, car il ne faut pas tomber dans l'erreur du vulgaire qui croit
 que les plumes de la chaleur ou du froid sont comme les plumes de la chaleur, mais
 mais venant les plumes de la chaleur qui sont de la chaleur, et de la
 conservent-elles la chaleur.

De voir comment l'air se lève et se baisse, et comment il se lève et se baisse
 quand il se lève et se baisse.

C'est le cas de deux sortes de plumes arrangées avec la même couche
 la même couche de plumes d'une de dire et ainsi successivement les plumes
 sont toujours internes et les plumes de la peau et les plumes externes, les plumes
 conservent la chaleur, car il ne faut pas tomber dans l'erreur du vulgaire qui croit
 que les plumes de la chaleur ou du froid sont comme les plumes de la chaleur, mais
 mais venant les plumes de la chaleur qui sont de la chaleur, et de la
 conservent-elles la chaleur.

De voir comment l'air se lève et se baisse, et comment il se lève et se baisse
 quand il se lève et se baisse.

C'est le cas de deux sortes de plumes arrangées avec la même couche
 la même couche de plumes d'une de dire et ainsi successivement les plumes
 sont toujours internes et les plumes de la peau et les plumes externes, les plumes
 conservent la chaleur, car il ne faut pas tomber dans l'erreur du vulgaire qui croit
 que les plumes de la chaleur ou du froid sont comme les plumes de la chaleur, mais
 mais venant les plumes de la chaleur qui sont de la chaleur, et de la
 conservent-elles la chaleur.



signe de direction en arrière.

Tous les animaux à 4 pieds se tiennent à ceux de derrière droits, ordonne les os posent à plomb les uns sur les autres de même que l'homme. Cela se voit ainsi, parce que dans les animaux qui les ont tous les en arrière,

et par conséquent les muscles, agissent toujours avec une grande force. On ne voit point de leur emboulement, ce qui dissiperoit prodigieusement des esprits. A cause de la pesanteur de cette machine, ainsi les muscles sont toujours bien tendus à la suite mais ils sont beaucoup balayés par

cette situation, ainsi que le mouvement de l'animal. Les os de la cuisse de cet animal est assez semblable à celui de l'homme, mais comme ils se trouvent une fois ^{plus} grand que celui de l'homme, plusieurs ont pris pour celui d'un grand, mais on le distingue parce que son col qui soutient une grosse vertèbre qui entre dans la cheville n'est point courbée comme celle de l'homme, à cause qu'il y a le trou de la cheville regarde la terre et dans l'homme il est de côté, outre cela elle n'a point de rochet.

quelques montrent aussi la mâchoire supérieure de cet animal pour celle d'un grand, mais on la distingue, parce qu'elle n'est si simple. Une denture ou a point de denture qu'il se trouve point en celle de l'homme.

Cette on montre pour la mâchoire de la terre, d'être ainsi que la mâchoire d'un poisson dans les arêtes sous rangées en manière de dents, mais les espaces sont remplis de membranes.

On voit aussi remarquer que les os du crâne sont de la même sorte, quoiqu'on dise que les os du crâne sont de la même sorte.

Avant que d'examiner les os du fémur il est bon de dire deux mots de la différence du squelette de l'homme avec celui de la femme. Presque tous les os de la femme sont plus longs, plus plats par les côtes, le derrière un peu plus élevé, les occipital plus épais, et au contraire de celle de l'homme, mais ils se sont rompus, puisqu'il est impossible de connaître le crâne d'un homme avec celui d'une femme.

La différence que l'on peut remarquer observer est que les os de la femme ont les os du crâne beaucoup plus plats que les os de l'homme, et la proéminence plus plate afin de rendre la gorge plus belle, et laisser plus de place aux mammelles, afin qu'elles puissent contre balancer les fesses qui sont aux femmes beaucoup plus grosses qu'aux hommes, et pour ce faire elles ont aussi les os des hanches, un peu plus larges et écartés afin de laisser la cavité du bassin plus ample pour loger la matrice, et l'enfant pendant la grossesse plus facilement.

On remarque encore que le cartilage qui joint les os pubis est beaucoup



plus epais qu'aux hommes, et meme plus souple afin qu'il puisse pesser et aller
plus facilement dans l'enfantement; et meme il se rendoit, quelque fois des
clouchements et la bonina que dans les violents efforts que la mere souffre les os
seussent entièrement, mais la nature ne le permet pas.

ACADEMIE ROYALE

DE
CHIRURGIE

G.

Enfin nous arrivons à l'os du front. C'est un os qui est à forme, et
qui est en deux parties. Nous commençons par celle de la face

vers les os de la face du fœtus ont de particularités et diffèrent de ceux des adultes.
en ce qu'ils laissent de grandes espaces entre eux. Les os de la face, et que
les espaces sont remplis par des membranes qui ne sont autre chose que
ce qui est encore tendues, examinons les à présent. Nous commençons par celle de la face.

Le frontal est divisé en deux par le sillon par la suture sagittale qui se
forme quelques mois après la naissance, et qui est une suture véritable,
non pour l'ordinaire elle se fait en telle sorte qu'il n'y en parait pas même
aucune trace, ni vestige, hors à la différence de tous les autres du corps
en ce qu'il parait par l'endroit qui fait la partie supérieure de l'orbite pour la
raison que nous dirons plus bas.

À la rencontre de la suture sagittale avec la coronale on trouve
un endroit qu'on nomme fontanelle, qui n'est autre chose qu'une membrane
qui vient à la place des os pour mieux dire un os encore membraneux. On voit
qu'on y joint avec les doigts le battement du sinus longitudinal supérieur
et l'indica dure au-dessus du sillon. On en voit de même d'autres
quelque temps après la naissance. Quelques fois se conserve toujours, cette
fontanelle s'aplatit plus aux parties aux qu'on avoue.

Les parietaux sont mous et flexibles, et on voit très bien les fibres qui les
composent d'autant plus sensibles à ceux des adultes.

Le squamosal est divisé en 4 parties qui laissent comme toutes les autres de la
face de grandes intervalles que des membranes occupent. La 1^{re} partie de
celui-ci fait le derrière de la tête. La 2^e et 3^e sont les côtés du trou occipital,
et la 4^e fait le devant du trou occipital. Le sillon de la suture.

Les temporaux sont divisés par une suture fort manifeste en
partie mailleuse, ou luy à rien de particulier, et en la partie propre
qui a plusieurs choses à remarquer.

Le conduit externe de l'oreille qui dans les adultes est osseux joint à
la même et fait une ligne de chemin. On remarque presque joint à
celui qui a osse l'oreille et l'oreille on voit le tympan au plan du tambour
qui est en chassée dans la grenaue qui est à la convexité du tympan.
Le conduit externe de l'oreille dans les adultes n'est joint à l'os au
conduit externe qu'on ne le voit pas. On aperçoit la grenaue et le tympan.

2^e que le timuçon, la coquille, et les osselets sont aussi durs et solides que
dans les adultes.

ACADEMIE ROYALE
CHIRURGIE

anneaux de semi-circulaire, le voyant, inspirés que de jeunesses
et apophyses, et ma. vides et. il y a des sous-vies petites et sous
M. les membranes marquées par de petits points ou en mentes.

3^e que le conduit de la glande parodans nous est osseux et membraneux,
un peu marqué dans ces os qui pour un trou seulement.

6^e le conduit qui naît de la cavité de la bouche en membraneux
les apophyses du larynx se joignent par de celui des adultes sinon que
les apophyses élongues sont très petites et cartilagineuses.
les humides ou cribriformes, a ses deux apophyses dont la première
regarde le dedans de la nez en digne enragée, l'autre qui s'avance dans
les os et les lames tranchées comme un et crible cartilagineux, mais les
os spongieux ou lames qui s'ouvrent la unique insigne d'une osseuse,
la cloison d'une insigne cartilagineuse.

des os de la mâchoire sont bien différents de ceux des adultes, l'inférieure
ne se sépare aisément en deux pièces vers le maxillaire, ou l'autre
cartilage.

l'ospière est courbée comme un arc, à cause de la morture que l'ospière
tient dans le ventre de la mère, ou s'en soustrait en un peloton,

mais à mesure qu'il avance en âge les muscles, oses et se fortifiant, l'os
comme le médullaire, et prend la figure naturelle.

Chaque ospière est formée de trois pièces, la première est la partie supérieure,
les deux autres sont les cornes de la partie inférieure de la cavité.

de sorte que l'apophyse oblique droite, et la morture de l'ospière forment
partie avant de l'autre l'os, et apophyses point droites qui s'élèvent et

transverses sont très petites, et cartilagineuses, les droites sont couchées
les unes sur les autres, car si le vacher eût été dur, et pointu comme

dans l'homme, sans doute dans les mouvements ou s'en irait de l'ospière
il aurait déchiré les membranes qui l'enveloppent ou opposé la unique

interne du collier de la matrice ou du vagina, les cartilages qui
occupent l'autre deux des os des vertèbres sont fort épais et souples

le sacrum est séparé en 4 ou 5 pièces le sacrum 3 ou 4.

le sternum qui dans ces ossements large et solide fait de deux pièces
seulement est composé de six os, petites parties perpendiculairement


l'une sur l'autre en un seul rang, dont l'antérieur est cartilagineux et
les autres sont membraneux.

les côtes vraies ont leurs extrémités qui regardent le sternum tournées
en haut et les fausses en bas, toutes ont leurs cartilages fort souples,



lourdes et couchées les unes sur les autres, leur articulation avec l'épine
en avant par les ligaments, en dedans, et derrière avec le sternum
membraneux.

Les os des ailes ne sont point différentes de celles des adultes.




La face d'os angles cartilagineux et principalement supérieur
est une saillie acromion, et coracoïde et scapulaire, et la saillie
est de l'humérus, sur laquelle on voit trois petites saillies de l'os des intercostals
remplies par des membranes ou cartilages très tendus sous la lèvre des
os des angles cartilagineux.

Les extrémités supérieures ou inférieures des os cartilagineux aux
endroits de leurs articulations lequel fait que les enfants ne peuvent
pas se tenir debout et marcher d'abord ny même de long temps après
leur naissance, comme le font les autres animaux, non de la la-
sseté de leurs fibres musculaires qui se fortifient à mesure que les os
s'endurcissent et du peu d'équilibre des esprits animaux.

Ce que nous venons de dire nous donne lieu d'admirer la nature
dans la merveilleuse charnière du fœtus en deux chefs principaux
le 1^{er} en le point quelle a eu de faire toutes les parties qui servent
aux organes d'entretien les 2^{es} en long temps avant la venue de
la vie, elle agit par elle-même. L'autre venoit d'être créée et
de l'enfant avant même que telle arrive bien souvent l'enfant
ne laissant pas d'avoir vie, et de jouir des fonctions animales,
est pour le fait que les os du fœtus commencent à s'endurcir par la
partie supérieure de l'os, comme nous avons remarqué, et non par
le milieu et comme sous les autres, et par lequel il devoit conserver
ce qui lui servoit de soutien, c'est pour cela que les os des oreilles,
et l'os de la coquille, sont aussi durs et solides que ceux d'un homme, car
que les os qui sont le long de la tête dans le fœtus pour soutenir la membrane
même d'un organe de l'oreille et les os de la tête.

Le 2^e est l'admirable mécanique que la nature a obtenue dans la
fabrique de la charnière du fœtus et la manière dont elle est disposée
sous les os de son corps pour faciliter la sortie, car tout le monde sait
que bien ^{que} l'enfant ne peut pas sortir, car c'est une mécanique très simple, et à une
forme et roide, sur le col interne de la matrice, et cependant il a trois
parties, savoir la tête, la poitrine, et les hanches, prodigieusement
grosses et d'un volume si peu proportionné à cette ouverture que l'enfant
ne peut pas que cela soit l'admiration de tout le monde, et que cela nous
prouve les miracles de la nature, cette mécanique consiste en ce
qu'elle a fait toutes les parties de plusieurs pièces et de pièces très petites



Nous examinerons aujourd'hui les différentes parties des os.

Il y a trois sortes de parties à considérer dans les os. Le premier est celui qui est commun à tous les os, le second est celui qui est propre à certains os, le troisième est celui qui est propre à certaines parties des os.

Le premier est celui qui est commun à tous les os, c'est la substance osseuse, qui est la plus dure, la plus compacte de tous les os, et qui est la plus résistante à la fracture.

Le second est celui qui est propre à certains os, c'est la substance cartilagineuse, qui est la plus tendre, la plus molle, et la plus susceptible de se déformer. Elle se trouve dans les os longs, et dans les os courts, et elle est la plus résistante à la fracture.

Le troisième est celui qui est propre à certaines parties des os, c'est la substance fibreuse, qui est la plus tendre, la plus molle, et la plus susceptible de se déformer. Elle se trouve dans les os longs, et dans les os courts, et elle est la plus résistante à la fracture.

Les principales différences des os sont de deux sortes, de leur figure, et de leur situation.

Les os peuvent être de deux sortes, car on les divise en os longs, et en os courts. Les os longs sont ceux qui ont une forme cylindrique, et les os courts sont ceux qui ont une forme cubique.

Les os longs se divisent en os longs et en os courts, et les os courts se divisent en os courts et en os longs. Les os longs sont ceux qui ont une forme cylindrique, et les os courts sont ceux qui ont une forme cubique.

Les os courts se divisent en os courts et en os longs, et les os longs se divisent en os longs et en os courts. Les os courts sont ceux qui ont une forme cubique, et les os longs sont ceux qui ont une forme cylindrique.

Les os longs se divisent en os longs et en os courts, et les os courts se divisent en os courts et en os longs. Les os longs sont ceux qui ont une forme cylindrique, et les os courts sont ceux qui ont une forme cubique.

la raison de leur formation les uns. Les autres. Mais les autres manières
epiphite en un mot grec qui signifie celui en adjoûné sur quelque autre chose.

Les epiphites sont à proprement parler, les connexes des extremités des os, elles
renferment toutes les eminences et les saillies qui servent aux articulations,
et il est aisé de les séparer du corps de los dans tous les jeunes âges.

On remarque deux choses dans cette séparation. La première est que les
surfaces par lesquelles les deux parties se joignent sont remplies de plusieurs
saillies et eminences, dont la plus part sont figurées en forme de diamant
enque les par leur moyen que les deux parties se joignent et se tiennent.
Les inégalités sont mieux marquées dans les animaux que dans l'homme.

Secondement on voit que la surface de l'epiphite qui se joint au corps de los
est revêtue du même cartilage. Tout cela est entouré extérieurement
d'un arté de singe par la combien les anatomistes se sont trompés quand ils
ont prétendu que cette union se fait par la symphyse. L'arté moyen, il est
bien vrai que les epiphites qui sont molles, tendres et d'une substance uniforme
dans les jeunes. Mais s'endurcissent à mesure qu'on avance en âge, et
se font dures. Et s'entourent de los, qu'elles ne font plus qu'un même
corps, mais cela ne signifie pas qu'il ne soit vrai de dire que ces deux parties
ont été distinguées dans les premières années de notre vie, en qu'elles
ont été assemblées par nature et engeance.

On remarque en détachant le premier des os des jeunes saiers qu'on peut
le conduire jusqu'à la partie de l'epiphite qui doit être enlevée, et
que la il faut se détacher, pour ainsi dire avec elle et les os
mais les os ne se détachent pas pour la nourriture. On peut découvrir
plusieurs usages considérables dans les epiphites.

1° est par le moyen des epiphites que les os font l'office de colonnes, en effet
pour appuyer les uns sur les autres et soutenir par leur dureté le
poids de tout l'animal, ils doivent avoir une base d'une largeur considérable.
C'est la base des epiphites ainsi que nous l'avons remarqué.

2° la largeur des epiphites est très nécessaire, puisqu'elle est dans le corps
de ces epiphites que toutes les eminences et saillies ne cessent de
l'articulation sont taillées.

3° cette disposition et forme des epiphites est d'une grande utilité par
rapport à la mécanique des mouvements. pour la bien entendre il faut
remarquer deux choses. La 1^{re} est que dans tous les os qui sont articulés
par encastrure, on arrondit l'apophyse du bas dans le milieu ou le centre
de l'apophyse ou reste de los. et que dans tous les os articulés par

par vingtaine, la pique du levier en dans toute la longueur que l'on suppose
passer par les deux ~~poles~~ de poles de l'extrémité cylindrique des os ainsi au si l'ailé
2^{me} que tous les tendons des muscles sont placés au tour des articules, car on
trouve qu'ils sont dans les apophyses qui sont toujours au voisinage de
l'articule, ou dans le corps de l'os même sans s'éloignant son articulation.

ACADEMIE

CHIRURGIE

C

On suppose comme on fait que la force est d'autant plus grande que
la ligne de direction est plus éloignée du centre de la pique; il est aisé de
comprendre pour quoy les extrémités des os ont dû estre groves pour clarrer
par leur résistance d'au moins de la distance de leur surface a le centre les
tendons des muscles, qui y sont ordinairement couchés; et quand il arrive
que le tendon n'est appuyé pas, pour lors le muscle en est plus éloigné
ce qui rend la force plus grande. C'est ce qui se remarque a l'égard du
biceps par exemple dans le mouvement du coude; car son tendon qui est
couché sur l'os quand le bras est étendu, et n'a de force que la distance qu'il y a
de la surface de l'os au centre de la pique, ce qui augmente la force.

2^o les epiphyses reçoivent de l'insertion des ligaments qui embrassent
l'articule; ce n'est pas assez que les membranes qui composent les ligaments
soient d'un tissu serré et compacte, il faut qu'elles soient enchevillées et
comme enclavées dans le corps des os pour qu'elles ne se relâchent point
par la violence et par la durée des mouvements, car ce qui arrive par
l'assemblage des epiphyses avec le corps de l'os, car les racines des ligaments
qui naissent de l'une des deux de ces suture se trouvent insensiblement
enchassées dans le corps de l'os a cause que les suture se serrent de plus
en plus et se joignent entièrement.

3^o Comme les epiphyses sont des parties tres importantes, leur jonction
avec le corps de l'os se fait par un assemblage qui ne se fait
si facilement.

on compte entre les parties des os leurs cavités. On les divise en trous,
conduits, fosses, sinus, sinuosités, suture et cavité proprement dite.

on appelle trou ce qui perce de part a part.

Conduit ce qui fait quelque chemin dans le corps de l'os.
fosse une enfoncement considerable dans le corps de l'os.

Sinus une cavité considerable entre les deux tables d'un os dont l'entrée est fort
étroite.

Sinuosité ou échancrure commune qui renferme quelque tendon
suture une échancrure qui sert a arrêter, retenir, ou unir.

le mot de cavité ne s'applique qu'aux enfoncements qui servent à l'articulation.
entre toutes ces cavités il y en a d'autres qui sont dans l'intérieur des os.



Tous les os du corps qui sont longs comme ceux des extrémités ont une cavité considérable dans leur milieu qui s'étend jusqu'à la naissance de leurs extrémités, lesquelles au lieu d'être creuses, sont toutes spongieuses. Tous les petits os du corps sont aussi tous spongieux et remplis de cellules.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

Cette mécanique est fort ingénieuse, les os doivent être durs pour le soutien du corps et ils doivent être légers pour être remués avec une très grande facilité, ce qui s'y a de dur et de solide dans les os est tellement ménagé qu'il est pour servir à la surface ou il forme un plancher, pour ainsi dire très mince pour le dedans étant creux et cette cavité n'est pas seulement pour former un canal à la moelle, mais principalement pour diminuer de la pesanteur, et lui donner plus de fermeté, les os creux sont plus difficiles à rompre que ceux qui sont solides en pareille quantité de même matière. Cette mécanique s'observe dans toutes les occasions ou les os doivent avoir un volume et une largeur considérable, comme dans les os du front à l'endroit des sourcils, dans les os de la mâchoire supérieure &c. dans le sternum des oiseaux, dans la tige de la plume &c. et c'est pour la même raison que les plumes des oiseaux et la tige des arbres sont creux.

pour vous faire comprendre ce qui suit il faut remarquer que les tendons de tous les muscles sont toujours placés et attachés autour de l'articulation.

Il y a plusieurs réflexions à faire sur cette situation par rapport à l'augmentation de la force des muscles. Il faut observer 1^o que dans tous les os articulés qui sont articulés par genou le centre du mouvement est au milieu de la boule. 2^o que dans celles qui sont articulées par ginglyme le centre du mouvement est dans toute la longueur de l'axe &c.

Cela étant, on voit que les puissances appliquées à des leviers ont d'autant plus de force que leurs directions sont plus éloignées de l'appuy de ces mêmes leviers, c'est à dire la nature semble avoir eu égard, quand elle a fait les extrémités des os fort grosses; car en plaçant ^{aut} comme elle a fait sur ces éminences les cordes tendineuses des muscles, elle en a d'autant plus augmenté la force, qu'elle les a par ce moyen plus éloignés du centre de leur mouvement.

Il arrive par là que le tendon, quoiqu'il touche sur l'articulation est toujours éloigné par la résistance de l'os du centre de son mouvement, du moins de la distance qu'il y a de la surface de la boule à son centre situation des membres, et en éloigne davantage; ainsi la force augmente


Cela se peut vérifier à l'égard du coude. ^{autre} Il y a une raison fort importante de cette situation.

hic loquitur et *facilita rem iniquis, sed admodum istos et magnos per commodus.*
 les muscles qui doivent faire de grands mouvements sont tellement liés par rapport aux parties qu'ils doivent mouvoir qu'un mouvement fort petit en peut produire un fort grand.

par exemple on peut démontrer que le muscle fléchisseur du coude n'est distant de la pique de son mouvement que de la vingtième partie de sa longueur, d'où il s'ensuit que le mouvement du coude doit être presque de vingt fois plus prompt que celui de son muscle; à savoir que quand le muscle ne fait qu'une ligne de chemin, le coude en fait vingt.



osteologie et maladies
des os



Ce sont les cahiers de monp.
de la prison, écrits de sa
propre main.

Osteologie

